

Informacje o rodzie kur nieśnych N-88 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):	-	3 095
- samce	-	669
- samice	-	2 426
2. Liczba sztukznaczonych indywidualnie:	-	2 695
- samce	-	269
- samice	-	2 426
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
1. dnia - 8. tygodnia - samce + samice (87 szt.)	-	2,81
1. dnia - do końca - samce + samice wychowu (105 szt.)	-	3,39
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- samce	220	-
- samice	1 840	-
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%) w okresie produkcji :		
- samce (8 szt.)	3,64	-
- samice (76 szt.)	4,13	-
3. Średni stan niosek (szt.)	1 780	-
4. Okres produkcji (tyg.)	39	-
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	213	-
- średniego	220	-
6. Liczba jaj wylęgowych od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	69	
- średniego	72	
7 Procent nieśności		
od nioski SP	78	
od nioski SL	81	
8. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	93,6	-
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	79,2	-
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	84,5	-

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszkańców w stopniu: - reprodukcyjnym - towarowym		
	Rosa 3, Rosa 5	
	Rosa 3, Rosa 5	

2023 r.

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: N-88

Cecha	ROK 2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18. tyg. życia	
a. samce	
- wartość średnia (g)	2 480,0
b. samice	
- wartość średnia (g)	1 844,0
- współczynnik zmienności	7,50
- odchylenie standardowe	137,3
- współczynnik odziedziczalności	0,35
2. Masa jaja w wieku 33-35 tyg. życia	
- wartość średnia (g)	65,1
- współczynnik zmienności	5,8
- odchylenie standardowe	3,70
- współczynnik odziedziczalności	0,49
3. Wiek dojrzałości płciowej	
- wartość średnia (dni)	142,3
- współczynnik zmienności	6,20
- odchylenie standardowe	9,60
- współczynnik odziedziczalności	0,33
4. Liczba jaj zniesionych do 35. tyg. życia	
- wartość średnia (szt.)	97,3
- współczynnik zmienności	10,30
- odchylenie standardowe	9,8
- współczynnik odziedziczalności	0,31

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	3
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	669 samców i 2426 samic
Zakres numeracji pisklącej	1-2697
Zakres numeracji stada dorosłego	wybrane znaczki pisklące

Informacje o rodzie kur nieśnych P-55 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):	-	2 545
- samce	-	586
- samice	-	1 959
2. Liczba sztukznaczonych indywidualnie:	-	2 245
- samce	-	286
- samice	-	1 959
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
1. dnia - 8. tygodnia - samce + samice (74 szt.)	-	2,91
1. dnia - do końca - samce + samice wychowu (86 szt.)	-	3,38
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- samce	160	-
- samice	1489	-
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%) w okresie produkcji :		
- samce (9 szt.)	5,63	-
- samice (57 szt.)	3,83	-
3. Średni stan niosek (szt.)	1428	-
4. Okres produkcji (tyg.)	39	-
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	211	-
- średniego	220	-
6. Liczba jaj wylęgowych od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	130	
- średniego	136	
7 Procent nieśności		
od nioski SP	77	
od nioski SL	81	
8. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	94,5	-
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	78,5	-
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	83,1	-

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszkańców w stopniu: - reprodukcyjnym - towarowym		
	Rosa 4 Rosa 4	

2023 r.

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: P-55

Cecha	ROK 2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18. tyg. życia	
a. samce	
- wartość średnia (g)	2 260,0
b. samice	
- wartość średnia (g)	1 622,0
- współczynnik zmienności	8,60
- odchylenie standardowe	143,5
- współczynnik odziedziczalności	0,34
2. Masa jaja w wieku 33-35 tyg. życia	
- wartość średnia (g)	63,9
- współczynnik zmienności	6,5
- odchylenie standardowe	4,10
- współczynnik odziedziczalności	0,45
3. Wiek dojrzałości płciowej	
- wartość średnia (dni)	146,7
- współczynnik zmienności	5,60
- odchylenie standardowe	8,20
- współczynnik odziedziczalności	0,45
4. Liczba jaj zniesionych do 35. tyg. życia	
- wartość średnia (szt.)	95,7
- współczynnik zmienności	10,07
- odchylenie standardowe	9,4
- współczynnik odziedziczalności	0,35

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów ondywidualnych	3
Liczba wylężonych piskląt ogółem	586 samców i 1959 zamic
Zakres numeracji pisklęcej	1-2295
Zakres numeracji stada dorosłego	Wybrane znaczki pisklęce

Informacje o rodzie kur nieśnych R-55 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):	-	4 366
- samce	-	1 042
- samice	-	3 324
2. Liczba sztukznaczonych indywidualnie:	-	3766
- samce	-	442
- samice	-	3324
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
1. dnia - 8. tygodnia - samce + samice (128 szt.)	-	2,93
1. dnia - do końca - samce + samice wychowu (207 szt.)	-	4,74
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- samce	230	-
- samice	2200	-
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%) w okresie produkcji :		
- samce (15 szt.)	6,52	-
- samice (153 szt.)	6,95	-
3. Średni stan niosek (szt.)	2103	-
4. Okres produkcji (tyg.)	40	-
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	201	-
- średniego	210	-
6. Liczba jaj wylęgowych od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	110	
- średniego	115	
7 Procent nieśności		
od nioski SP	72	
od nioski SL	75	
8. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	95,7	-
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	80,3	-
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	84,0	-

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszkańców w stopniu: - reprodukcyjnym - towarowym		
	Rosa 1, Rosa 2, Rosa 3, Rosa 4 Rosa 1, Rosa 2, Rosa 3, Rosa 4	

2023 r.

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: R-55

Cecha	ROK 2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18. tyg. życia	
a. samce	
- wartość średnia (g)	2 450,0
b. samice	
- wartość średnia (g)	1 821,0
- współczynnik zmienności	7,10
- odchylenie standardowe	134,8
- współczynnik odziedziczalności	0,55
2. Masa jaja w wieku 33-35 tyg. życia	
- wartość średnia (g)	61,8
- współczynnik zmienności	5,9
- odchylenie standardowe	3,60
- współczynnik odziedziczalności	0,33
3. Wiek dojrzałości płciowej	
- wartość średnia (dni)	144,0
- współczynnik zmienności	5,74
- odchylenie standardowe	8,60
- współczynnik odziedziczalności	0,35
4. Liczba jaj zniesionych do 35. tyg. życia	
- wartość średnia (szt.)	82,5
- współczynnik zmienności	12,90
- odchylenie standardowe	10,2
- współczynnik odziedziczalności	0,33

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba legów indywidualnych		3
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	1042 samców i 3324 samic	
Zakres numeracji pisklęcej	1-3786	
Zakres numeracji stada dorosłego	1-2113	



Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):	-	4 265
- samce	-	2 206
- samice	-	2 059
2. Liczba sztukznaczonych indywidualnie:	-	2 365
- samce	-	306
- samice	-	2 059
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
1. dnia - 8. tygodnia - samce + samice (140 szt.)	-	3,28
1. dnia - do końca - samce + samice wychowu (162 szt.)	-	3,80
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- samce	160	-
- samice	1450	-
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%) w okresie produkcji :		
- samce (7 szt.)	4,38	-
- samice (98 szt.)	6,76	-
3. Średni stan niosek (szt.)	1381	-
4. Okres produkcji (tyg.)	40	-
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	198	-
- średniego	208	-
6. Liczba jaj wylęgowych od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	81	
- średniego	85	
7 Procent nieśności od nioski SP	71	
od nioski SL	74	
8. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	97,4	-
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	82,1	-
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	84,3	-

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszkańców w stopniu: - reprodukcyjnym - towarowym		
	Rosa 1, Rosa 2, Rosa 3, Rosa 4 Rosa 1, Rosa 2, Rosa 3, Rosa 4	

2023 r.

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: S-11

Cecha	ROK 2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18. tyg. życia	
a. samce	
- wartość średnia (g)	2 230,0
b. samice	
- wartość średnia (g)	1 669,0
- współczynnik zmienności	6,40
- odchylenie standardowe	111,5
- współczynnik odziedziczalności	0,47
2. Masa jaja w wieku 33-35 tyg. życia	
- wartość średnia (g)	61,1
- współczynnik zmienności	5,5
- odchylenie standardowe	3,30
- współczynnik odziedziczalności	0,37
3. Wiek dojrzałości płciowej	
- wartość średnia (dni)	145,1
- współczynnik zmienności	6,80
- odchylenie standardowe	10,10
- współczynnik odziedziczalności	0,12
4. Liczba jaj zniesionych do 35. tyg. życia	
- wartość średnia (szt.)	87,0
- współczynnik zmienności	12,20
- odchylenie standardowe	10,7
- współczynnik odziedziczalności	0,12

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	3
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	2206 samców i 2059 samic
Zakres numeracji pisklącej	1-2385
Zakres numeracji stada dorosłego	1-1501

Informacje o rodzie kur nieśnych S-55 wpisanym do Księgi Głównej

a) Wyniki oceny wartości użytkowej rodu:

Cecha	ROK	
	2022/2023	2023/2024
I. Okres wychowu		
1. Liczba ptaków przyjętych do wychowu (szt.):	-	21 244
- samce	-	431
- samice	-	20 813
2. Liczba sztuk znaczonych indywidualnie:	-	3479
- samce	-	431
- samice	-	3048
3. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%):		
1. dnia - 8. tygodnia - samce + samice (675 szt.)	-	3,18
1. dnia - do końca - samce + samice wychowu (921 szt.)	-	4,34
II. Okres produkcji		
1. Stan ptaków na początku produkcji (szt.):		
- samce	240	-
- samice	2099	-
2. Padnięcia i brakowania zdrowotne (%) w okresie produkcji :		
- samce	4,10	-
- samice	0,49	-
3. Średni stan niosek (szt.)	1995	-
4. Okres produkcji (tyg.)	42	-
5. Liczba jaj od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	197,52	-
- średniego	207,81	-
6. Liczba jaj wylęgowych od nioski stanu (szt.):		
- najwyższego	95	
- średniego	100	
7 Procent nieśności		
od nioski SP	67	
od nioski SL	71	
8. Parametry wylęgowości jaj (%)		
- zapłodnienie jaj	93,4	-
- wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych	78,0	-
- wyląg piskląt zdrowych z jaj zapłodnionych	83,5	-

b) Planowane krzyżowanie w celu uzyskania mieszkańców w stopniu: - reprodukcyjnym - towarowym		
	Rosa 1, Rosa 2, Rosa 3, Rosa 4 Rosa 1, Rosa 2, Rosa 3, Rosa 4	

2023 r.

c) Wyniki oceny wartości genetycznej rodu: S-55

Cecha	ROK 2022/2023
1. Masa ciała w wieku 18. tyg. życia	
a. samce	
- wartość średnia (g)	2 540,0
b. samice	
- wartość średnia (g)	1 717,0
- współczynnik zmienności	8,10
- odchylenie standardowe	146,8
- współczynnik odziedziczalności	0,37
2. Masa jaja w wieku 33-35 tyg. życia	
- wartość średnia (g)	63,5
- współczynnik zmienności	5,6
- odchylenie standardowe	3,60
- współczynnik odziedziczalności	0,27
3. Wiek dojrzałości płciowej	
- wartość średnia (dni)	140,9
- współczynnik zmienności	5,90
- odchylenie standardowe	8,70
- współczynnik odziedziczalności	0,41
4. Liczba jaj zniesionych do 35. tyg. życia	
- wartość średnia (szt.)	90,5
- współczynnik zmienności	12,10
- odchylenie standardowe	10,8
- współczynnik odziedziczalności	0,35

d) Lęgi indywidualne i zastosowana numeracja ptaków

Liczba lęgów indywidualnych	3
Liczba wylęzonych piskląt ogółem	431 samców i 20813 samic
Zakres numeracji pisklącej	1-3539
Zakres numeracji stada dorosłego	Wybrane znaczkę pisklące