


KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA
w Warszawie

WYNIKI OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ DROBIU WODNEGO W 2024 ROKU





CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI:



Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel./faks +48 22 828 23 89
e-mail: krd-ig@krd-ig.com.pl
www.krd-ig.com.pl

PREZES ZARZĄDU: mgr inż. Dariusz Goszczyński

Dział Hodowli i Oceny Drobiu KRD-IG z siedzibą w Poznaniu
ul. Naramowicka 144, 60-975 Poznań, skr. poczt. 11
tel. 61 824-26-51 (do 53)
e-mail: poznan@krd-ig.pl

Kierownik Działu: dr inż. Eugeniusz Wencek

Opracowanie merytoryczne:

dr inż. Eugeniusz Wencek
inż. Aleksandra Głębocka
mgr inż. Mateusz Grzelak
mgr inż. Iwona Kałużna
inż. Łukasz Kozak
dr inż. Marta Pałyszka
mgr inż. Agnieszka Sobierajska
mgr inż. Wojciech Suchocki
inż. Krzysztof Winiarski
prof. dr hab. inż. Barbara Biesiada-Drzazga

Wydawnictwo:

Wiadomości Drobiarskie Sp. z o.o., ul. Naramowicka 144, 61-619 Poznań

ISBN 978-83-62401-21-5
5,2 arkusza wydawniczego

Przy publikowaniu całości lub fragmentów biuletynu oraz informacji i danych liczbowych
prosimy o podanie źródła

SPIS TREŚCI

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ DROBIU WODNEGO

(Ilekoć w spisie treści oraz w całym opracowaniu jest mowa o 2025 r. należy przez to rozumieć okres od miesiąca stycznia do kwietnia 2025 r. włącznie)

Lp.	Treść Biuletynu	Strona
1.	Punkt I. Omówienie wyników wartości użytkowej stad rodzicielskich i towarowych gęsi ocenionych w 2024 r.	7
2.	Punkt II. Omówienie wyników wartości użytkowej stad rodzicielskich i towarowych kaczek typu pekin ocenionych w 2024 r.	15
3.	Tabela 1. Zestawy hodowlane drobiu reprodukcyjnego dystrybuowane w Polsce w 2024 r.	19
4.	Tabela 2. Liczba ocenionych stad rodzicielskich gęsi oraz dynamika oceny w 2024/2023	24
5.	Tabela 3. Liczba samic rodzicielskich gęsi przyjętych w Polsce do wychowu w latach 2021-2025	24
6.	Tabela 4. Struktura wiekowa stad reprodukcyjnych gęsi ocenionych w latach 2020-2025 [liczba stad, liczebność samic (tys. szt.) i ich procentowy udział w poszczególnych sezonach użytkowania]	25
7.	Tabela 5. Wylęgi piskląt towarowych gęsi w Polsce w latach 2021-2025	26
8.	Tabela 6. Polska – import i eksport piskląt towarowych gęsi w latach 2021-2025	26
9.	Tabela 7. Liczba wylęzonych piskląt towarowych gęsi u największych producentów w UE w latach 2021-2025	27
10.	Tabela 8. Najwięksi eksporterzy i importerzy piskląt towarowych gęsi w UE w okresie od miesiąca stycznia do kwietnia 2025 r.	27
11.	Tabela 9. Liczba ocenionych stad rodzicielskich kaczek typu pekin oraz dynamika oceny 2024/2023	28
12.	Tabela 10. Liczba piskląt hodowlanych kaczek (szt. samic) przyjętych do wychowu w latach 2021-2025	28
13.	Tabela 11. Wylęgi piskląt towarowych kaczek w Polsce w latach 2021-2025 (tys. szt.)	29
14.	Tabela 12. Polska – import i eksport piskląt towarowych kaczek w latach 2021-2025 (tys. szt.)	29
15.	Tabela 13. Wielkość wylęgów piskląt towarowych kaczek u największych producentów w UE w latach 2021-2025 (tys. szt.)	30
16.	Tabela 14. Najwięksi eksporterzy i importerzy piskląt towarowych kaczek w UE w okresie od m-ca stycznia do kwietnia 2025 r. (tys. szt.)	30
17.	Tabela 15. Stada rodzicielskie gęsi – wychów	31
18.	Kartodiagram 1. Stada rodzicielskie gęsi – okres wychowu, padnięcia i brakowania zdrowotne samic	32
19.	Tabela 16. Liczba stad rodzicielskich gęsi w poszczególnych województwach – wychów	33
20.	Tabela 17. Stada rodzicielskie gęsi – pierwszy sezon produkcji	34
21.	Kartodiagram 2. Stada rodzicielskie gęsi – 1. sezon produkcji, padnięcia i brakowania zdrowotne samic	35
22.	Wykres 1. Stada rodzicielskie gęsi – 1. sezon produkcji, liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej w zależności od długości okresu produkcji	36
23.	Tabela 18. Stada rodzicielskie gęsi – 1. sezon produkcji, liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach	37
24.	Tabela 19. Stada rodzicielskie gęsi – drugi sezon produkcji	38

25.	Kartodiagram 3. Stada rodzicielskie gęsi – 2. sezon produkcji, padnięcia i brakowania zdrowotne samic	39
26.	Wykres 2. Stada rodzicielskie gęsi – 2. sezon produkcji, liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej w zależności od długości okresu produkcji	40
27.	Tabela 20. Stada rodzicielskie gęsi – 2. sezon produkcji, liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach	41
28.	Tabela 21. Stada rodzicielskie gęsi – trzeci sezon produkcji	42
29.	Kartodiagram 4. Stada rodzicielskie gęsi – 3. sezon produkcji, padnięcia i brakowania zdrowotne samic	43
30.	Wykres 3. Stada rodzicielskie gęsi – 3. sezon produkcji, liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej w zależności od długości okresu produkcji	44
31.	Tabela 22. Stada rodzicielskie gęsi – 3. sezon produkcji, liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach	45
32.	Tabela 23. Stada rodzicielskie gęsi – czwarty sezon produkcji	46
33.	Kartodiagram 5. Stada rodzicielskie gęsi – 4. sezon produkcji, padnięcia i brakowania zdrowotne samic	47
34.	Wykres 4. Stada rodzicielskie gęsi – 4. sezon produkcji, liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej w zależności od długości okresu produkcji	48
35.	Tabela 24. Stada rodzicielskie gęsi – 4. sezon produkcji, liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach	49
36.	Tabela 25. Stada rodzicielskie gęsi – piąty sezon produkcji	50
37.	Kartodiagram 6. Stada rodzicielskie gęsi – 5. sezon produkcji, padnięcia i brakowania zdrowotne samic	51
38.	Wykres 5. Stada rodzicielskie gęsi – 5. sezon produkcji, liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej w zależności od długości okresu produkcji	52
39.	Tabela 26. Stada rodzicielskie gęsi – 5. sezon produkcji, liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach	53
40.	Tabela 27. Stada rodzicielskie gęsi – produkcja od pierwszego do piątego sezonu, zestawienie według sezonu produkcji	54
41.	Tabela 28. Stada rodzicielskie gęsi – produkcja od pierwszego do piątego sezonu, zestawienie według tygodni / dni produkcji	55
42.	Kartodiagram 7. Stada rodzicielskie gęsi – od 1. do 5 sezonu produkcji, padnięcia i brakowania zdrowotne samic	56
43.	Wykres 6. Stada rodzicielskie gęsi – od 1. do 5. sezonu produkcji, liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej w zależności od długości okresu produkcji	57
44.	Kartodiagram 8. Stada rodzicielskie gęsi – od 1. do 5 sezonu produkcji, średni procent nieśności, średnia liczba jaj zniesionych, średnia liczba jaj nałożonych do wylęgu oraz średnia liczba piskląt od nioski stanu początkowego	58
45.	Kartodiagram 9. Stada rodzicielskie gęsi – udział samic w poszczególnych sezonach produkcji	59
46.	Tabela 29. Stada rodzicielskie gęsi – produkcja od 1. do 5. sezonu, liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach	60
47.	Tabela 30. Stada towarowe gęsi	61
48.	Tabela 31. Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – wychów	62
49.	Kartodiagram 10. Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – okres wychovu, padnięcia i brakowania zdrowotne samic	63
50.	Tabela 32. Liczba stad rodzicielskich kaczek w poszczególnych województwach – wychów	64
51.	Tabela 33. Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – produkcja	65
52.	Kartodiagram 11. Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – okres produkcji, padnięcia i brakowania zdrowotne samic	66

53.	Kartodiagram 12. Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – średni procent nieśności, średnia liczba jaj zniesionych, średnia liczba jaj nałożonych do wylęgu oraz średnia liczba piskląt od nioski stanu początkowego	67
54.	Tabela 34. Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – pierwszy sezon produkcji	68
55.	Wykres 7. Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – pierwszy sezon produkcji, liczba jaj wylęgowych od nioski początkowej oraz średnia liczba dni produkcji nieśnej	69
56.	Tabela 35. Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – drugi sezon produkcji	70
57.	Wykres 8. Stada rodzicielskie kaczek typu pekin – drugi sezon produkcji, liczba jaj wylęgowych od nioski początkowej oraz średnia liczba dni produkcji nieśnej	71
58.	Tabela 36. Liczba stad rodzicielskich kaczek w poszczególnych województwach – produkcja	72
59.	Tabela 37. Kaczki typu pekin – stada brojlerów kaczyc	73

I. Omówienie wyników wartości użytkowej stad rodzicielskich i towarowych gęsi ocenionych w 2024 r.

Stada rodzicielskie gęsi

Wychów

Wyniki oceny wartości użytkowej stad rodzicielskich gęsi, które w 2024 r. zakończyły wychów, należących do dwóch zestawów hodowlanych (gęś Biała Kołudzka® ♂ W-33 x ♀ W-11 i Tapphorn), zamieszczono w tabelach 15 – 16 oraz w kartodiagramie 1. Ogółem oceniono 46 stad rodzicielskich, w tym 44 stad gęsi Białej Kołudzkiej® ♂ W-33 x ♀ W-11 oraz 2 stada gęsi Tapphorn (Tabela 15).

Ogółem w 2024 r. przyjęto do wychowu 15 860 samców i 64 914 samic (Tabela 15).

Średnia liczba przyjętych do wychowu samic we wszystkich ocenionych stadach wyniosła 1.411 ptaków i w porównaniu do 2023 r. liczba ta wzrosła 247 sztuk.

Padnięcia i brakowania zdrowotne gęsi we wszystkich 46. stadach wyniosły średnio 3,6% dla samców i 3,7% dla samic (Tabela 15), zaś wartości tych wskaźników w poszczególnych województwach przedstawiono w Kartodiagramie 1. W porównaniu do 2023 r. padnięcia i brakowania w zestawie hodowlanym ♂ W-33 x ♀ W-11 zmalały o 0,4 p.p. u samców, zaś u samic wzrosły o 0,9 p.p.

Wskaźnik zużycia mieszanki paszowej pełnoporcjowej na średnią sztukę dla wszystkich stad odchowanych wyniósł 36,9 kg i kształtował się w przedziale od 36,5 kg dla zestawu hodowlanego gęsi Białej Kołudzkiej® ♂ W-33 x ♀ W-11 do 43,5 kg dla mieszańca Tapphorn (Tabela 15).

Jak wynika z tabeli 16 rozmieszczenie w poszczególnych województwach 46. stad rodzicielskich gęsi, których wychów oceniono w 2024 r., nie było równomierne. Najwięcej stad przyjęto do wychowu w województwie kujawsko – pomorskim i wielkopolskim (po 14 stad – po 30,4%), a najmniej w województwach: podlaskim, śląskim i warmińsko-mazurskim (po 1. stadzie – po 2,17%). Średni stan początkowy samic przyjętych do wychowu w stadach rodzicielskich gęsi wahał się od 200. ptaków w województwie warmińsko – mazurskim do 2002. ptaków w województwie wielkopolskim.

Produkcja

Stada rodzicielskie gęsi w pierwszym sezonie produkcji

W tabelach 17 – 18 oraz na wykresie 1 i kartodiagramie 2 przedstawiono wyniki oceny wartości użytkowej stad rodzicielskich gęsi, które w 2024 r. zakończyły pierwszy sezon nieśności. Ocenie poddano 54 stada rodzicielskie, w tym 52 stada rodzicielskie zestawu hodowlanego gęsi Białych Kołudzkich® ♂ W-33 x ♀ W-11 oraz 2 stada gęsi Tapphorn.

Obsada ptaków na początku produkcji w grupie 54. stad produkujących w pierwszym sezonie wyniosła średnio 269 gęsiorów i 1.107 gąsek (Tabela 17). Najwyższą obsadą zarówno do samców, jak i samic charakteryzowały się stada gęsi Białych Kołudzkich® ♂ W-33 x ♀ W-11 (odpowiednio 273 i 1.124 ptaków). Zaś w grupie 2. stad rodzicielskich gęsi Tapphorn średnia liczba użytkowanych samców i samic wynosiła odpowiednio 171 i 644 ptaków (Tabela 17).

Wskaźnik padnięć i brakowań zdrowotnych u gęsiorów w stadach rodzicielskich w pierwszym roku produkcji wyniósł średnio 5,3% u gęsiorów, zaś u gąsek 5,0% (Tabela 17). Największą wartość tego parametru odnotowano w 2. stadach gęsi Tapphorn, odpowiednio 5,8% u samców i 6,1% u samic.

Najniższym wskaźnikiem nieśności charakteryzował zestaw gęsi Tapphorn (30,3%), zaś w stadach rodzicielskich gęsi Białych Kołudzkich® ♂ W-33 x ♀ W-11 odnotowano jego wartość na poziomie 31,3% (Tabela 17).

Średnia liczba jaj wylęgowych od nioski stanu początkowego dla 54. stad rodzicielskich gęsi wyniosła 49,5 szt. przy średniej liczbie 163. dniach produkcji nieśnej. W zestawie hodowlanym gęsi Białych Kołudzkich® ♂ W-33 x ♀ W-11 parametr ten kształtował się na poziomie 49,7 jaj w ciągu 163. dni produkcji nieśnej, zaś u mieszańca Tapphorn w trakcie 149. dni sezonu reprodukcji 43,8 jaj wylęgowych (Tabela 17).

Średni współczynnik zapłodnienia jaj dla 54. stad reprodukcyjnych gęsi, które zakończyły w 2024 r. pierwszy sezon produkcji wyniósł 77,5% (Tabela 17). Największą wartością tego parametru odznaczyły się 2. stada rodzicielskie gęsi Tapphorn (80,8%) i były wyższe w odniesieniu do gęsi Białych Kołudzkich® ♂ W-33 x ♀ W-11 o 3,5 p.p. W interpretacji tych wyników należy uwzględnić niską reprezentację stad rodzicielskich gęsi Tapphorn w ogólnej liczbie ocenionych stad, których liczebność kształtowała się na poziomie 3,85%.

Zużycie mieszanki paszowej pełnoporcjowej na średnią sztukę dla stad rodzicielskich, które w 2024 r. zakończyły pierwszy rok produkcji wyniosło średnio 60,3 kg i kształtowało się w przedziale od 53,6 kg dla mieszańca Tapphorn użytkowanego średnio przez 149 dni nieśności do 60,5 kg dla zestawu gęsi Białych Kołudzkich® ♂ W-33 x ♀ W-11, których reprodukcja trwała średnio 163 dni (Tabela 17).

W tabeli 18 podano rozmieszczenie w poszczególnych województwach 54. stad rodzicielskich gęsi, które w 2024 r. zakończyły pierwszy sezon nieśności. Najwięcej stad było w województwie kujawsko – pomorskim (16 stad – 29,6%), a nieco mniej w województwie wielkopolskim (15 stad

– 27,8%). Najmniej stad było w województwach: dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim i podkarpackim (po 1. stadzie – po 1,9%). Średni stan początkowy samic w stadach rodzicielskich gęsi wahał się od 720. sztuk w województwie pomorskim do 1.313 sztuk w województwie wielkopolskim (Tabela 18).

W tabeli 17 oraz na wykresie 1 przedstawiono wyniki użytkowości 54. stad jednorocznych gęsi rodzicielskich w zależności od długości trwania produkcji. Najwięcej stad użytkowano od 22. do 25. tygodnia produkcji nieśnej (33 stada – 61,1%), zdecydowanie mniej powyżej 25. tygodni (11 stad – 20,4%), a najmniej do 21. tygodni (10 stad – 18,5%).

Jak wynika z tabeli 17 i wykresu 1 największą liczbą jaj wylęgowych od nioski stanu początkowego charakteryzowały się stada użytkowane powyżej 25. tygodni produkcji nieśnej (51,9 szt.), mniejszą stada użytkowane od 22. do 25. tygodnia produkcji nieśnej (51,3 szt.), a najmniejszą stada produkujące do 21. tygodnia (40,9 szt.). Najwyższy procent nieśności osiągnęły stada użytkowane do 21. tygodnia produkcji nieśnej (32,1%), nieco mniej stada produkujące od 22 do 25. tygodnia produkcji (32,0%), a najniższy stada, których sezon reprodukcyjny trwał powyżej 25. tygodni (28,5%) (Tabela 17). Wskaźnik ten wszystkich 54. stad rodzicielskich w pierwszym sezonie produkcji wyniósł 31,3% i kształtował się od 30,3% dla 2. stad gęsi Tapphorn do 31,3% dla 52. stad gęsi Białych Kołudzkich® ♂ W-33 x ♀ W-11 (Tabela 17).

Najwyższe zapłodnienie jaj (78,9%) zanotowano w stadach użytkowanych do 21. tygodnia produkcji nieśnej w dalszej kolejności w stadach produkujących od 22. do 25. tygodnia (78,3%), a najniższe w stadach, których okres reprodukcji trwał powyżej 25. tygodni (72,8%) (Tabela 17).

Najwyższym wskaźnikiem wylęgu piskląt zdrowych z jaj nałożonych charakteryzowały się stada użytkowane do 21. tygodnia produkcji (68,6%). Dla stad użytkowanych w pozostałych przedziałach czasowych wartość tego wskaźnika była wynosiła od 59,3% (powyżej 25. tygodnia) do 61,7% (od 22. do 25. tygodnia produkcji nieśnej) (Tabela 17).

Stada reprodukcyjne gęsi w drugim, trzecim, czwartym i piątym sezonie produkcji

Wyniki oceny wartości użytkowej stad reprodukcyjnych gęsi będących w 2024 r. w drugim, trzecim, czwartym i piątym sezonie produkcji, należących do dwóch zestawów hodowlanych (gęś Biała Kołudzka® ♂ W-33 x ♀ W-11 i gęś Nadwarciańska) przedstawiono w tabelach 19 – 26, na wykresach 2 – 5 i kartodiagramach 3 – 6. Ogółem oceniono 136 stad, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły stada w drugim sezonie produkcji (49 stad), a najmniejszą stada w piątym sezonie reprodukcji (8 stad).

Średnia obsada samic w stadach będących w różnych sezonach produkcji, w 2024 r., wynosiła od 697 sztuk (stada w piątym sezonie nieśności) do 1 469 ptaków (stada w drugim sezonie nieśności).

Padnięcia i brakowania zdrowotne samców we wszystkich 136. stadach w kolejnych sezonach produkcji, mieściły się w granicach od 5,5% (drugi sezon produkcji) do 32,6% (piąty sezon produkcji), natomiast dla samic wskaźnik ten kształtował się od 5,4% (drugi sezon produkcji) do 25,5% (piąty sezon produkcji).

Średnia liczba jaj wylęgowych od nioski stanu początkowego dla wszystkich 136. stad, które zakończyły drugi, trzeci, czwarty lub piąty sezon produkcji wyniosła od 35,9 sztuk w piątym sezonie nieśności do 50,3 sztuk w sezonie drugim.

Średni wskaźnik nieśności w poszczególnych sezonach nieśności wyniósł od 25,9% (stada w piątym sezonie produkcji) do 31,5% (stada w drugim sezonie).

Zapłodnienie jaj w stadach rodzicielskich w drugim, trzecim, czwartym i piątym sezonie produkcji kształtowało się w przedziale od 77,4% (stada w piątym sezonie) do 80,4% (stada w drugim sezonie produkcji).

Średni procent wylęgu piskląt zdrowych z jaj nałożonych we wszystkich 136. stadach rodzicielskich gęsi produkujących w 2024 r. w drugim, trzecim, czwartym i piątym sezonie wahał się od 60,4% (stada w czwartym roku produkcji) do 63,7% (stada w drugim sezonie produkcji).

Średnia liczba dni produkcji nieśnej dla stad gęsi ocenianych w drugim, trzecim, czwartym i piątym sezonie wyniosła odpowiednio 162 dni, 164 dni, 156 dni i 154 dni.

Zużycie mieszanki paszowej pełnoporcjowej na sztukę średnią dla 136. stad, które zakończyły w 2024 r. drugi, trzeci, czwarty i piąty sezon produkcji wyniosło od 58,1 kg (czwarty sezon) do 64,3 kg (piąty sezon).

Przedstawione w tabelach 19, 21, 23, 25 wyniki oceny wartości użytkowej stad rodzicielskich gęsi 2-, 3-, 4- i 5-letnich zestawione w zależności od długości produkcji, wskazują, że na 49 stad ocenionych w drugim sezonie produkcji najwięcej (26 stad – 53,1%) użytkowano od 22. do 25. tygodnia produkcji. W trzecim, czwartym i piątym sezonie nieśności, w których oceniono odpowiednio 43, 36 i 8 stad rodzicielskich najwięcej z nich również użytkowano w przedziale czasowym od 22. do 25. tygodni. (odpowiednio: 27 stad – 62,8%, 26 stad – 72,2% i 5 stad – 62,5%). Największą liczbą dni produkcji nieśnej charakteryzowały się stada zestawu gęsi Białej Kołudzkiej® użytkowane przez 163 dni w drugim i 164 dni w trzecim sezonie produkcji.

Jak wynika z tabel 20, 22, 24, 26 rozmieszczenie w poszczególnych województwach stad rodzicielskich gęsi kończących kolejny sezon produkcji było bardzo nierównomierne. Najwięcej stad gęsi w 2-gim, 3-cim, 4-tym i 5-tym sezonie produkcji było w województwie kujawsko-pomorskim (odpowiednio: 16 stad – 32,7%, 13 stad – 30,2%, 13 stad – 36,1%, 4 stada – 5,0%). Najmniej, po jednym stadzie, w województwach: dolnośląskim (w 2-gim i 4-tym sezonie), lubuskim (w 2-gim i 3-cim sezonie), łódzkim (w 2-gim i 5-tym sezonie), podlaskie (w 4-tym sezonie), podkarpackim

(w 3-cim sezonie), pomorskim (w 5-tym sezonie), śląskim (w 3-cim sezonie), warmińsko – mazurskim (w 2-gim, 4-tym i 5-tym sezonie) oraz wielkopolskim (w 5-tym sezonie).

Podobnie jak rozmieszczenie stad również średni stan początkowy samic dla stad rodzicielskich gęsi wieloletnich w poszczególnych województwach był bardzo zróżnicowany i wahał się od 180. sztuk w województwie warmińsko-mazurskim (stado w piątym sezonie produkcji) do 15.406 sztuk w województwie dolnośląskim (stado w drugim sezonie produkcji).

W tabelach 27 – 29 oraz na wykresie 6 i kartodiagramach 7 – 9, przedstawiono zestawienia zbiorcze wyników oceny wszystkich 190. stad rodzicielskich gęsi, które w 2024 r. zakończyły produkcję (od pierwszego do piątego sezonu). Stada te zostały przyjęte do wychowu w latach 2019 – 2023. Dane te w proponowanym układzie, poprzez podanie łącznych wyników uzyskanych przez wszystkie stada w danym roku produkcji, prezentowane są po raz kolejny i w sposób istotny uzupełniają dotychczasowe informacje dotyczące oceny stad rodzicielskich gęsi w poszczególnych sezonach nieśności oraz zestawów hodowlanych użytkowanych w Polsce. Zamieszczone zostały również zbiorcze wyniki oceny produkcji poszczególnych zestawów hodowlanych. Dodatkowe i tak szczegółowe informacje dotyczące użytkowości stad rodzicielskich gęsi powinny zainteresować nie tylko indywidualnych hodowców, właścicieli stad należących do określonych zestawów hodowlanych, ale także wszystkie firmy hodowlane rozprowadzające w Polsce swój materiał.

Wyniki oceny 190. stad rodzicielskich gęsi w zależności od sezonu produkcji zaprezentowano w tabeli 27. Przedstawione dane wskazują, że:

- największą liczbę jaj zniesionych od nioski stanu początkowego uzyskały stada, które w 2024 r. zakończyły pierwszy i drugi sezon nieśności (odpowiednio 50,8 i 51,6 szt. jaj), a najmniejszą stada w piątym sezonie (39,5 szt. jaj);
- największą liczbę jaj wylęgowych i nałożonych do wylęgu od nioski stanu początkowego uzyskały stada, które w 2024 r. zakończyły drugi sezon (odpowiednio 50,3 i 50,0 szt. jaj), a najmniejszą stada w piątym sezonie (odpowiednio 35,9 i 35,6 szt. jaj);
- najwyższy wskaźnik tempa nieśności uzyskały stada, które w 2024 r. zakończyły drugi sezon (31,5%), nieco mniejszy stada w pierwszym roku użytkowania (31,3%), a najniższy stada pięcioletnie (25,9%);
- najwyższy wskaźnik zapłodnienia jaj uzyskały stada, które w 2024 r. zakończyły drugi sezon, użytkowania (80,4%), a najniższy stada produkujące w piątym sezonie (77,4%);
- najwyższy wskaźnik wylęgu piskląt zdrowych z jaj nałożonych uzyskały stada, które w 2024 r. zakończyły drugi sezon (63,7%), a najniższy stada użytkowane w czwartym sezonie (60,4%);

- najdłużej użytkowane były stada, które w 2024 r. zakończyły trzeci sezon nieśności (164 dni), nieco mniej stada dwuletnie i jednoroczne (odpowiednio 163 i 162 dni), a najkrócej stada pięcioletnie (154 dni);
- najniższe zużycie mieszanki paszowej pełnoporcjowej na sztukę średnią uzyskały stada, które w 2024 r. zakończyły czwarty sezon (58,1 kg w ciągu 156. dni produkcji), a najwyższe stada w piątym roku użytkowania (64,3 kg w trakcie 154. dni nieśności). Wartość średnia kształtowała się na poziomie 60,5 kg paszy w ciągu 161. dni nieśności;
- najwyższy wskaźnik padnięć i brakowań zdrowotnych u samców stwierdzono w stadach użytkowanych w piątym sezonie nieśności (32,6%), a najniższy w stadach w pierwszym sezonie produkcji (5,3%);
- najwyższy wskaźnik padnięć i brakowań zdrowotnych u samic stwierdzono w stadach użytkowanych w piątym sezonie nieśności (25,5%), a najniższy w stadach w pierwszym sezonie produkcji (5,0%);
- stada użytkowane w piątym sezonie reprodukcyjnym uzyskały:
 - mniejszą liczbę jaj zniesionych porównaniu do stad w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym roku nieśności (różnica odpowiednio od 6,9 szt. do 12,1 szt. jaj oraz) przy krótszym okresie użytkowania od 2. (czwarty sezon) do 10. dni (trzeci sezon);
 - niższy wskaźnik tempa nieśności w porównaniu do stad użytkowanych od drugiego do czwartego sezonu produkcji (różnica od 3,9 p.p. – stada w czwartym sezonie do 5,6 p.p. – stada w drugim sezonie) przy krótszym okresie użytkowania od 2. (czwarty sezon) do 10. dni (trzeci sezon);
 - mniejszą liczbę jaj wylęgowych w porównaniu do stad w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym roku nieśności (różnica odpowiednio od 9,4 szt. – stada w czwartym sezonie do 14,4 szt. jaj – stada w drugim sezonie) przy krótszym okresie użytkowania od 2. (czwarty sezon) do 10. dni (trzeci sezon);
 - mniejsze zapłodnienie jaj od stad użytkowanych od 1. do 4. sezonu (różnica od 0,1 p.p. – stada w pierwszym sezonie do 3,0 p.p. – stada w drugim roku nieśności); mimo najmniejszej liczby samic przypadających na jednego samca;
 - niższy wskaźnik wylęgu piskląt zdrowych z jaj nałożonych w porównaniu do stad w drugim sezonie nieśności (różnica 1,0 p.p.), natomiast w odniesieniu do stad rodzicielskich użytkowanych w 1., 3. i 4. sezonie wskaźnik ten przyjmował wartości wyższe od 0,1 p.p. (stada w 1. roku produkcji) do 2,3 p.p. (stada w 4. roku nieśności);

Tabela 28 zawiera zestawienie wyników oceny stad rodzicielskich należących do trzech zestawów hodowlanych gęsi: Białych Kołudzkich® ♂ W-33 x ♀ W-11, Nadwarciańska i Tapphorn w zależności od tygodni produkcji użytkowanych od pierwszego do piątego sezonu nieśności. Przedstawione w niej dane wskazują, że z ogólnej liczby 190. stad najliczniejszą grupę (117 stad – 61,6%) użytkowano w przedziale od 22. do 25. tygodni produkcji, zdecydowanie mniej liczne (38 stad – 20,0%) w przedziale do 21. tygodni oraz powyżej 25. tygodni reprodukcji (35 stad – 18,4%).

W tabeli 29 przedstawiono rozmieszczenie w poszczególnych województwach wszystkich 190. stad rodzicielskich gęsi oraz stan początkowy samców i samic w tych stadach użytkowanych od 1. do 5. sezonu nieśności. Z tabeli tej wynika, że najwięcej stad reprodukcyjnych gęsi było w województwie kujawsko – pomorskim (62 stada – 32,6%), mniej w wielkopolskim (40 stad – 21,1%), a najmniej w województwach opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim (po 2 stada – po 1,1%). Średni stan początkowy samic dla wszystkich 190. stad wyniósł 1.219 sztuk i wahał się w granicach od 661. sztuk (stada w województwie pomorskim) do 5.990 sztuk (stada w województwie dolnośląskim).

Stada towarowe gęsi

W tabeli 30 przedstawiono wyniki oceny stad towarowych gęsi, których odchów został zakończony w 2024 r. Odchów przebiegał łącznie dla samców i samic gęsi na zasadach właściwych dla produkcji *Młodej Polskiej Gęsi Owsianej*.

Ogółem oceniono 818.015 ptaków w 139. stadach towarowych gęsi W-31 pochodzących od zestawu gęsi Białej Kołudzkiej® ♂ W-33 x ♀ W-11, co stanowi reprezentatywną próbę 13,64% z ogólnej liczby gęsi towarowych wprowadzonych w Polsce do obrotu w 2024 r. W obliczeniu tego wskaźnika uwzględniono poziom wylęgu piskląt towarowych w 2024 r. (6.481.330 ptaków obojga płci) i saldo handlu zagranicznego (- 488.150 piskląt) (Tabele 5-6).

Średnia liczba piskląt przyjętych do odchowu to 5.885 sztuk. W porównaniu do 2023 r. średnia liczba piskląt przyjętych do odchowu wzrosła o 1.160 ptaków.

Padnięcia ptaków we wszystkich ocenionych stadach towarowych gęsi wyniosły średnio 4,4 % i w porównaniu do 2023 r. wskaźnik ten zmalał o 0,5 p.p.

Średnia masa ciała gęsi towarowych skierowanych do uboju wyniosła 6,47 kg i w porównaniu do 2023 r. wzrosła o 0,08 kg.

Średnie zużycie mieszanki paszowej pełnoporcjowej na kg masy ciała wyniosło 5,29 kg i w porównaniu do 2023 r. wartość tego wskaźnika zmalała o 0,07 kg.

Średnia liczba dni odchowu wyniosła 119 dni i w porównaniu do 2023 r. wzrosła o 3 dni.

W 2024 r. dla ocenionych stad towarowych gęsi wyliczona została średnia wartość Europejskiego Wskaźnika Wydajności (EWW). Wartość ta wyniosła 98,2 punktu (Tabela 30) i w porównaniu do 2023 r. wzrosła o 0,4 pkt.

Zestawienie wyników oceny stad towarowych gęsi w zależności od liczby dni odchowu wskazuje, że większą grupę ocenionych stad (81 stad – 58,3%) stanowiły stada utrzymywane średnio do 120. dnia, a 58 stad (41,7%) utrzymywano powyżej 120 dni. Stada utrzymywane powyżej 120. dni, odchowu, w porównaniu do stad utrzymywanych do 120. dni, odznaczyły się mniejszymi o 0,4 p.p. padnięciami ptaków (4,2%), wyższą o 0,70 kg średnią masę ciała (6,85 kg) i mniejszym o 0,19 kg średnim zużyciem paszy treściwej na kg masy ciała (5,16 kg) oraz wyższą o 3,2 punktów średnią wartością wskaźnika EWW (100,1 pkt.) (Tabela 30).

II. Omówienie wyników wartości użytkowej stad rodzicielskich i towarowych kaczek typu pekin ocenionych w 2024 r.

Stada rodzicielskie kaczek

Wychów

Wyniki oceny wartości użytkowej wszystkich 47. stad rodzicielskich kaczek typu pekin, których wychów został zakończony w 2024 r., należących do 6. zestawów hodowlanych zamieszczono w tabelach 31 – 32 oraz kartodiagramie 10.

Ogółem oceniono 47 stad kaczek typu pekin, w tym najwięcej stad zestawu hodowlanego SM3 Heavy (20 stad – 42,6%), a najmniej stad zestawu White Pekin (1. stado – 2,1%) (Tabela 31).

Średnia liczba przyjętych do wychovu piskląt we wszystkich 47. stadach kaczek typu pekin wyniosła 797 kaczorów i 3.918 kaczek, przy czym największą obsadą samców i samic charakteryzowało się stado zestawu hodowlanego SM3 Medium (odpowiednio 1.407 i 7.035 ptaków), a najmniejszą stado zestawu hodowlanego P-55 x P-44 (odpowiednio 67 i 260 ptaków) (Tabela 31). W porównaniu do 2023 r. średnia liczebność samców i samic we wszystkich stadach zmalała (odpowiednio o 167 i 789 ptaków).

Padnięcia i brakowania zdrowotne kaczek typu pekin wyniosły średnio 5,4% dla samców i 3,8% dla samic (Tabela 31). Najniższe wartości tego wskaźnika dla samców i samic odnotowano w stadach zestawu hodowlanego P-55 x P-44 (odpowiednio 3,5% i 1,2%). Największe padnięcia i brakowania samców odnotowano w stadzie White Pekin (11,8%), zaś u samic w 20. stadach zestawu SM3 Heavy (4,6%). W porównaniu do 2023 r. średnia wartość wskaźnika padnięć i brakowań dla samców i samic zmalała odpowiednio o 1,2 p.p. oraz 0,9 p.p.

Wskaźnik zużycia mieszanki paszowej pełnoporcjowej na średnią sztukę dla 47. stad kaczek typu pekin wyniósł 25,9 kg i kształtował się na poziomie od 23,9 kg dla stad zestawu hodowlanego SM3 Heavy do 27,4 kg dla stada zestawu P-55 x P-44 (Tabela 31). Wskaźnik ten w porównaniu do 2023 r. uległ zwiększeniu o 1,8 kg.

Z tabeli 32 pokazującej rozmieszczenie w poszczególnych województwach wszystkich 47. stad kaczek typu pekin, których wychów został zakończony w 2024 r. wynika, że stada te były zlokalizowane w dziesięciu województwach. Najwięcej tych stad było w województwie wielkopolskim (16 stad – 34,0%), a najmniej w województwach mazowieckim, pomorskim i zachodniopomorskim (po 1. stadzie – po 2,1%). Średni stan początkowy samic w stadach rodzicielskich kaczek wahał się

od 240 ptaków w województwie kujawsko – pomorskim do 6.125 kaczek w województwie dolnośląskim (Tabela 32).

Produkcja

W tabelach 33 – 36 oraz na wykresach 7 – 8 i kartodiagramach 11 – 12 przedstawiono wyniki oceny wartości użytkowej 60. stad rodzicielskich kaczek typu pekin należących do sześciu zestawów hodowlanych, które produkcję zakończyły w 2024 r. Spośród tych stad oceniono 54 stada w pierwszym sezonie produkcji (Tabela 34, Wykres 7), zaś dla 6. stad był to drugi rok użytkowania (Tabela 35, Wykres 8).

Średni stan początkowy samców i samic w 60. stadach kaczek typu pekin należących do 6. zestawów hodowlanych wyniósł 690 kaczorów i 3.490 kaczek (Tabela 33). W porównaniu do 2023 r. średnia liczebność ptaków w stadach kaczek typu pekin zmalała u kaczorów o 117 szt., zaś u samic o 510 szt.

Padnięcia i brakowania zdrowotne w stadach rodzicielskich kaczek typu pekin wyniosły średnio 11,8% dla kaczorów i 11,1% dla kaczek (Tabela 33). Najniższą wartość wskaźniki te osiągnęły dla kaczorów i kaczek stada zestawu hodowlanego P-55 x P-44 (odpowiednio 7,1% i 3,4%), a najwyższą u kaczorów w stadzie ST5 Super Heavy (29,8%) i u samic w stadach SM3 Medium (15,8%) (Tabela 33). W porównaniu do 2023 r. średnia wartość wskaźnika padnięć i brakowań wzrosła u kaczorów o 0,6 p.p., zaś u kaczek zmalała o 1,4 p.p.

Średnia liczba jaj wylęgowych od nioski stanu początkowego w 60. stadach kaczek typu pekin wyniosła 176,8 sztuk, przy średniej długości dni produkcji nieśnej wynoszącej 276 dni (Tabela 33). Największą liczbą jaj wylęgowych w stadach kaczek typu pekin charakteryzował się zestaw hodowlany STAR 53 H.Y. (High Yield), w którym pozyskano 218,3 jaj w ciągu 336. dni produkcji nieśnej. Najniższym uzyskiem jaj wylęgowych odznaczył się mieszaniec kaczek P-55 x P-44 104,5 szt. w ciągu 198. dni nieśności (Tabela 33). W porównaniu do 2023 r. średnia liczba jaj wylęgowych zmalała o 54,0 szt. przy 61. dniowym krótszym okresie użytkowania.

Średnia wartość wskaźnika nieśności dla stad kaczek typu pekin wyniosła 66,4% i mieściła się w przedziale od 55,7% (stada zestawu P-55 x P-44) do 76,4% (stada zestawu ST5 Super Heavy) (Tabela 33). W porównaniu do 2023 r. średnia wartość wskaźnika nieśności dla stad kaczek typu pekin zmniejszyła się o 0,3 p.p.

Wskaźnik zapłodnienia jaj dla 60. stad kaczek typu pekin wyniósł średnio 91,9% i wahał się w przedziale od 88,3% w stadach zestawu P-55 x P-44 do 93,5% w stadach zestawu SM3 Medium (Tabela 33). W porównaniu do 2023 r. odnotowano zmniejszenie tego wskaźnika o 0,5 p.p.

Wskaźnik wylęgu piskląt zdrowych z jaj nałożonych dla stad kaczek typu pekin wyniósł średnio 73,5% i był najwyższy w stadzie rodzicielskim zestawu hodowlanego SM3 Heavy (75,6%) (Tabela 33). W porównaniu do 2023 r. wartość tego wskaźnika dla stad kaczek typu pekin zwiększyła się o 0,1 p.p.

Największą wytrzymałością w nieśności w zestawach hodowlanych kaczek typu pekin wykazały się stada zestawu Star 53 H.Y. (High Yield) (336 dni) (Tabela 33).

Jak przedstawiono w tabeli 36 rozmieszczenie w poszczególnych województwach 60. stad rodzicielskich kaczek, które zakończyły produkcję w 2024 r., nie było równomierne. Najwięcej stad było rozmieszczonych w województwie wielkopolskim (24 stada – 40,0%), mniej w województwie łódzkim (15 stad – 25,0%), a najmniej w województwach: mazowieckim, pomorskim i świętokrzyskim (po 1. stadzie, tj. po 1,7%). Najwyższym średnim stanem początkowym samic charakteryzowały się stada użytkowane w województwie warmińsko-mazurskim (5.030 szt.), natomiast stado z najniższą liczbą samic zanotowano w województwie pomorskim (295 ptaków).

Stada brojlerów kaczyc

Wyniki oceny wartości użytkowej stad brojlerów kaczyc skierowanych do uboju w 2024 r. przedstawiono w tabeli 37. Ogółem oceniono 1.792.366 ptaków w 194. stadach kaczek typu pekin sześciu mieszańców towarowych, co stanowi reprezentatywną próbę 6,17% z ogólnej liczby kaczek towarowych wprowadzonych w Polsce do obrotu w 2024 r. W obliczeniu tego wskaźnika uwzględniono poziom wylęgu piskląt towarowych w 2024 r. (29.040.500 ptaków obojga płci) i dodatnie saldo handlu zagranicznego (7.288.660 piskląt) (Tabele 11 – 12). Odchów stad towarowych przebiegał łącznie dla samców i samic (Tabela 37).

Spośród ocenionych stad brojlerów kaczek najliczniej reprezentowany był mieszaniec Star 53 H.Y. (High Yield) (68 stad), mniej licznie stada pochodzące po zestawie hodowlanym ST5 Heavy (52 stada), a najmniej stada kaczek P-54 (7 stad) (Tabela 37).

Średnia liczba piskląt w stadach brojlerów kaczek typu pekin przyjętych do odchovu wynosiła 9.239 ptaków (Tabela 37) i w porównaniu do 2023 r. liczebność tych stad wzrosła o 1.486 ptaków.

Padnięcia w 194. stadach brojlerów kaczek typu pekin wynosiły 4,9% i w porównaniu do 2023 r. wartość tego wskaźnika zmalała o 0,6 p.p. Najmniejszym wskaźnikiem padnięć odznaczył się mieszaniec P-54 (3,7%), zaś największym stada ST5 Super Heavy (6,5%) (Tabela 37).

Średnia masa ciała kaczek typu pekin w ocenionych stadach, uzyskana w ciągu 45. dni odchowu, wynosiła 3,43 kg, przy średnim zużyciu paszy treściwej na kg masy ciała wynoszącym 2,47 kg (Tabela 37). W porównaniu do 2023 r. wartości średniej masy ciała kaczek oraz zużycia paszy treściwej zmalały o 0,02 kg, a odchów był krótszy o 1 dzień. Największą masą ciała odznaczył się zestaw SM3 Heavy (3,54 kg) uzyskaną w ciągu 48 dni odchowu i zużyciu mieszanki paszowej pełnoporcjowej na poziomie 2,53 kg. Nieco mniejszą masę ciała uzyskał mieszaniec P-54 (3,53 kg) osiągniętą przy najniższym wśród ocenionych stad wskaźniku zużycia mieszanki paszowej pełnoporcjowej na kg przyrostu masy ciała (2,32 kg) i w okresie odchowu trwającym 44 dni (Tabela 37).

Średnia wartość Europejskiego Wskaźnika Wydajności (EWW) dla ocenionych 194. stad brojlerów kaczek typu pekin wyniosła 293,8 punktów i kształtowała się w przedziale od 282,6 punktów dla mieszańców pochodzących po zestawie SM3 Heavy do 336,5 punktów dla stad mieszańca P-54 (Tabela 37). W porównaniu do 2023 r. wartość Europejskiego Wskaźnika Wydajności (EWW) wzrosła o 6,3 pkt.

Tabela 1

Zestawy hodowlane drobiu reprodukcyjnego dystrybuowane w Polsce w 2024 r.

Wykaz zestawów hodowlanych	Firmy dystrybuujące materiał hodowlany	Przedstawicielstwo w Polsce
KURY MIĘSNE 		
 ROSS 308	Aviagen Group Cummings Research Park 920 Explorer Boulevard NW Huntsville, AL 35806 Stany Zjednoczone tel. +1 256 890 3800 faks +1 256 890 3919 info@aviagen.com www.aviagen.com Aviagen EPI B.V. Elmpteweg 47 6042 KJ Roermond Holandia www.aviagen.com	Aviagen EPI Sp. z o.o. Zębowo 71 A 87-126 Obrowo tel. 56 674 72 00 dkulik@aviagen.com
 COBB 500	Cobb Germany Avimex GmbH Peter-Henlein Str. 1 93128 Regenstauf Niemcy tel. +49 9402 930 747 faks +49 9402 930 750 e-mail: info@cobb-germany.com www.cobb-germany.com	Ireneusz Rosada tel. 607 289 556 Piotr Czaplicki tel. 607 722 420 Tomasz Torgowski tel. 602 490 355
 HUBBARD JA-57 HUBBARD JA-87 HUBBARD JA-57R HUBBARD JA-57E HUBBARD REDBRO	Od 2018 r. właścicielem firmy Hubbard jest Aviagen Group. Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) HUBBARD SAS Mauguérand, 22800 Le Fœcil – Quintin Francja tel.: +33 2 96 79 63 70 E-mail: contact.emea@hubbardbreeders.com	Hubbard Polska Sp. z o.o. Pawłów Trzebnicki 71 55-110 Prusice tel. 71 312 62 30 faks 71 321 62 67 e-mail: biuro@hubbard-polska.pl www.hubbard-polska.pl Iwona Susła — Dyrektor Generalny tel.: +48 600 839 489, i.susla@hubbard-polska.pl
KURY NIEŚNE 		
	KURY NIEŚNE DO PÓŁINTENSYWNEJ PRODUKCJI JAJ	
	KURY NIEŚNE DO INTENSYWNEJ PRODUKCJI JAJ	
  MESSA P  MESSA 26 MESSA 43 MESSA 72	MESSA Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Mieni ul. Kokoszki 12, 05-319 Cegłów woj. mazowieckie tel. 25 757 02 02, 25 757 01 93 e-mail: messa@messa-mienia.pl www.messa-mienia.pl	

 HY-LINE HY-LINE GRAY	Europa Valeriy Stepanenko Sales and Technical Manager tel. +386 41 928 070 e-mail: vstepanenko@hyline.com www.hyline.com Tom Dixon Global Sales & Marketing Director tdixon@hyline.com Hy-Line (UK) e-mail: enquiries@hyline.co.uk www.hy-line.co.uk	H&P Sp. z o.o. Wylęg i Hodowla Drobiu Sp. K. ul. Katowicka 78B 43-186 Orzesze-Gardawice tel. 32 221 50 22 kom. 664 220 201 faks 32 221 56 30 www.kurki-hp.com.pl e-mail: zwdgardawice@kurki-hp.com.pl H&P Sp. z o.o. Odchów i Hodowla Drobiu Sp. K. ul. Szeroka 45 44-246 Palowice tel. 32 431 75 01 kom. 664 220 201 faks 32 431 77 06 e-mail: kurki@kurki-hp.com.pl www.kurki-hp.com.pl
 LOHMANN BROWN CLASSIC LOHMANN SANDY LOHMANN WHITE	Lohmann Tierzucht GmbH Am Seedeich 9-11 27472 Cuxhaven Niemcy tel. +49 4721 505 137 faks +49 4721 505 222 e-mail: info@ltz.de www.ltz.de	Opol-Drob Sp. z o.o. ul. Traugutta 8 49-200 Grodków tel. 77 415 52 15 kom. 600 025 929 faks 77 415 31 60 e-mail: opoldrob@neostrada.pl www.opoldrob.pl Drobiarstwo Opolskie Sp. z o.o. ul. Opolska 39 49-100 Niemodlin tel. 77 460 64 26 faks 77 460 67 27 e-mail: drobiarstwo@op.pl www.drobiarstwo.com.pl
 ISA BROWN ISA TINT BOVANS WHITE DEKALB WHITE	Institut de Sélection Animale BV Villa 'de Körver' Sporstraat 69, P.O. Box 114 5830 AC Boxmeer Holandia tel. +31 485 319 111 faks +31 485 319 112 e-mail: info.isa@hendrix-genetics.com www.isapoultry.com	DH – Doradztwo Hodowlane Marek Lisak ul. Artyleryjska 36/1 59-220 Legnica tel. 76 721 37 12 kom. 606 437 263 e-mail: marek.lisak@hendrix-genetics.com e-mail: marekll@interia.eu
 TETRA SL TETRA TINT	Bábolna TETRA Kft. H-2943 Bábolna Radnóti Miklós u. 16. Węgry tel. +36 34568176 tel. +36 95345008 e-mail: info@babolnatetra.com www.babolnatetra.com	-
 DOMINANT LEGHORN D-229  DOMINANT SUSSEX D-104 DOMINANT BLUE D-107 DOMINANT BARRED D-959 DOMINANT BLACK D-109	DOMINANT CZ LIHEŇ STUDENEC s.r.o. Studenec 183 67502 Koněšín Czechy tel. +420 568 627 918 tel. +420 568 627 910 e-mail: info@lihen-studenec.cz www.dominant-cz.cz dr Milan Tyller tel. +420 602 642 557 tel. +420 723 714 896 e-mail: info@dominant-cz.cz	-

DOMINANT BLACK D-149 DOMINANT BROWN D-192 DOMINANT RED D-853 DOMINANT COLOURED D-259 DOMINANT RED BARRED D-159 DOMINANT TRICOLOR D-301 DOMINANT GOLD D-902 DOMINANT BLUE D-187 DOMINANT GREENSHELL GS-159 DOMINANT GREENSHELL GS-107 DOMINANT GREENSHELL GS-300 DOMINANT GREENSHELL GS-959 DOMINANT DARKSHELL DS-109 DOMINANT GREENSHELL GS-229 DOMINANT GREENSHELL GS-459 DOMINANT BLACK DS-109 DOMINANT SUSSEX AMBER D-804 DOMINANT TINTED D-723		
  ROSA 1 ROSA 3 ROSA 5	Zarodowa Ferma Kur Rszew Sp. z o.o. ul. Klonowa 93, 95-050 Konstantynów Łódzki woj. łódzkie tel. 42 211 15 85, 42 211 19 99 e-mail: rszew@poczta.fm www.rszew.pl	
INDYKI 		
 HYBRID CONVERTER CONVERTER NOVO	Hendrix Genetics Ltd Hybrid Turkeys LLC 650 Riverbend Drive, Suite C650 Kitchener N2K 3S2 Canada tel. +1 519 578 2740 faks +1 519 578 1870 e-mail: info.hybrid@hendrix-genetics.com www.hybridturkeys.com Hendrix Genetics Turkeys Europe La Bohardiere, BP1 St-Laurent de la Plaine 49290 Mauges sur Loire Francja tel. +33 241 742 121 faks +33 241 783 838 e-mail: info.hybrid@hendrix-genetics.com www.hybridturkeys.com	Grelavi SA ul. Budowlana 2A 10-424 Olsztyn tel. 89 534 68 68 faks 89 534 10 19 e-mail: grelavi@hendrix-genetics.com www.grelavi.pl
 BUT 6	Aviagen Turkeys, Inc. 31186 Midland Trail East Lewisburg West Virginia 24901 Stany Zjednoczone tel. +1 304 793 2680 fax +1 304 793 2684 e-mail: turkeysinc@aviagen.com Aviagen Turkeys Ltd. Chowley Five Chowley Oak Business Park Tattenhall, Cheshire CH3 9GA Wielka Brytania	Zdrowy Drób Sp. z o.o. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn tel. 89 644 89 01 e-mail: sekretariat@indykpol.pl www.indykpol.pl Filia we Frednowach OHI Frednowy 77B, 14-200 Iława tel. 89 644 89 00 faks 89 644 89 01

	tel. +44 1829 772 020 fax +44 1829 772 059 e-mail: turkeysLtd@aviagen.com www.aviagenturkeys.us	
KACZKI 		
 STAR 53 H.Y. (High Yield)	Grimaud Frères Sélection 3 La Corbière - Roussay 49450 Sèvremoine Francja tel. +33 241 703 690 fax +33 241 703 167 www.grimaudfreres.com	
 ST5 HEAVY ST5 SUPER HEAVY	Orvia Gourmaud Sélection Centre de sélection La Seigneurie Saint-André-Treize-Voies 85260 Montréverd Francja tel. +33 240 020 200 faks +33 240 020 207 e-mail: contact@orvia.fr www.orvia.fr	Orvia Polska Łukasz Stoniewicz tel. 503 792 779 e-mail: lukasz.stoniewicz@orvia.fr
 P-55 x P-44 A-55 x F-11	Adam Belt Ośrodek Hodowli Kaczek Lińsk 114 89-530 Śliwice woj. kujawsko-pomorskie 664 115 634 e-mail: beltadam@wp.pl	materiał rodzicielski i towarowy pochodzący od fermy zarodowej kaczek rozprowadza: Zakład Wylęgu Drobiu ul. Kolejowa 12, 89-500 Tuchola woj. kujawsko-pomorskie tel. 52 334 36 27 e-mail: pawel.budaj@tuchola.pl
 SM3 HEAVY SM3 MEDIUM	Cherry Valley Farms Ltd Unit 1, Blossom Avenue, Humberston, Grimsby, North Lincolnshire, DN36 4TQ Wielka Brytania tel. +44 147 2808 400 faks +44 147 2751 431 e-mail: international@cherryvalley.co.uk www.cherryvalley.co.uk	
GĘSI 		
 BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej Krajowy Ośrodek Badawczo-Hodowlany Gęsi Kołuda Wielka ul. Parkowa 1 88-160 Janikowo woj. kujawsko-pomorskie e-mail: koluda@iz.edu.pl e-mail: kw_inkub@poczta.onet.pl www.koluda.pl	

 TAPPHORN od 03.01.2024 r.	Gänsehof Tapphorn & Inge's Laden KG Klünpott 7 49393 Lohne Niemcy tel. 04442 4192 0179 3217350 04442 72818 info@gaensehof-tapphorn.de www.gaensehof-tapphorn.de/	-
 GĘŚ NADWARCIAŃSKA	Grupa Animpol Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Podmiejska 21A 66-400 Gorzów Wielkopolski woj. lubuskie tel. 95 728 23 44 95 725 96 59 e-mail: info@animpol.pl www.animpol.pl	-

 materiał pochodzący z zagranicznej hodowli

 materiał pochodzący z Polski

Tabela 2. Liczba ocenionych stad rodzicielskich gęsi oraz dynamika oceny w 2024 r.

Okres oceny	Liczba ocen	Dynamika oceny 2024/2023 (%)
WYCHÓW	46	82,14
PRODUKCJA	190	91,35

źródło: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie (KRD-IG)

Tabela 3. Liczba samic rodzicielskich gęsi przyjętych w Polsce do wychowu w latach 2021–2025 (szt.)

Miesiąc/Rok	2021	2022	2023	2024	2025*
Styczeń	-	-	-	-	-
Luty	-	2 013	-	-	-
Marzec	10 258	22 911	4 881	10 767	14 090
I kwartał	10 258	24 924	4 881	10 767	14 090
Kwiecień	31 041	24 131	27 942	18 707	34 570
Maj	31 465	27 406	26 797	32 140	
Czerwiec	19 543	14 213	4 247	2 475	
II kwartał	82 049	65 750	58 986	53 322	34 570
Rok	92 307	90 674	63 867	64 089	48 660

* dane do miesiąca kwietnia 2025 r. włącznie

źródło: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie (KRD-IG)

Tabela 4. Struktura wiekowa stad reprodukcyjnych gęsi ocenionych w latach 2020-2025 [liczba stad, liczebność samic (tys. szt.) i ich procentowy udział w poszczególnych sezonach użytkowania]

Rok	Wyszczególnienie	Ogółem	Sezon użytkowania				
			I	II	III	IV	V
2020	Liczba stad	334	73	89	81	65	26
	Liczba samic	347,17	80,82	90,50	95,00	60,43	20,42
	Udział samic (%)	100,0	23,3	26,1	27,3	17,4	5,9
2021 ¹⁾	Liczba stad	284	48	71	81	66	18
	Liczba samic	287,83	55,76	72,43	82,42	61,59	15,63
	Udział samic (%)	100,0	19,4	25,2	28,6	21,4	5,4
2022 ²⁾	Liczba stad	241	54	42	69	73	3
	Liczba samic	264,51	92,16	44,61	60,66	64,09	2,99
	Udział samic (%)	100,0	34,9	16,9	22,9	24,2	1,1
2023 ³⁾	Liczba stad	208	53	47	42	57	9
	Liczba samic	258,34	86,40	76,45	42,34	43,40	9,74
	Udział samic (%)	100,0	33,4	29,6	16,4	16,8	3,8
2024 ⁴⁾	Liczba stad	190	54	49	43	36	8
	Liczba samic	231,54	59,76	71,99	61,30	32,92	5,57
	Udział samic (%)	100,0	25,8	31,1	26,5	14,2	2,4
2025 ⁵⁾	Liczba stad	178	44	50	46	38	-
	Liczba samic	214,32	60,75	52,22	62,79	38,56	-
	Udział samic (%)	100,0	28,3	24,4	29,3	18,0	-

¹⁾ stan samic na dzień 31 stycznia 2021 r., po weryfikacji danych w dniu 06.03.2021 r. z uwzględnieniem likwidacji stad z tytułu HPAI

²⁾ stan samic na dzień 14 lutego 2022 r., nie ujęto stad zlikwidowanych z tytułu HPAI (17. stad na łączną liczbę 32.374. samic ubitych w dniach od 25 marca 2021 r. do 06.02.2022 r.) oraz stad, które zakończyły produkcję w 2021 r.

³⁾ stan samic na dzień 31 stycznia 2023 r.

⁴⁾ stan samic na dzień 31 stycznia 2024 r.

⁵⁾ stan samic na dzień 23 marca 2025 r., po uwzględnieniu likwidacji w 2025 r. 22.611. samic w 16. stadach z tytułu stwierdzonej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

źródło: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie (KRD-IG)

Tabela 5. Wylęgi piskląt towarowych gęsi w Polsce w latach 2021–2025 (tys. szt.)

Miesiąc/Rok	Liczba piskląt gęsich				
	2021	2022	2023	2024	2025*
Styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luty	91,29	206,88	197,68	290,96	188,12
Marzec	1 329,11	1 392,79	1 328,63	1 340,25	1 174,16
Kwiecień	1 693,73	1 557,62	1 571,14	1 751,16	1 458,70
Maj	1 485,64	1 790,07	1 679,46	1 360,64	
Czerwiec	1 091,62	1 274,06	1 512,26	1 034,50	
Lipiec	450,38	468,59	733,06	651,07	
Sierpień	57,06	102,99	145,66	52,33	
Wrzesień	<i>brak danych</i>	<i>brak danych</i>	<i>brak danych</i>	0,42	
Październik	0,00	0,00	0,00	0,00	
Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	6 198,83	6 793,00	7 167,89	6 481,33	2 820,98

** dane do miesiąca kwietnia 2025 r. włącznie

źródło: Eurostat

Tabela 6. Polska – import i eksport piskląt towarowych gęsi w latach 2021–2025 (tys. szt.)

Lata	Import	Eksport	Saldo handlu zagranicznego
2020	0,00	0,90	0,90
2021	0,00	391,12	391,12
2022	0,00	411,34	411,34
2023	23,62	443,16	419,54
2024	0,00	488,15	488,15
2025*	0,00	202,54	202,54

* dane za okres od miesiąca stycznia do kwietnia 2025 r.

źródło: Eurostat

Tabela 7. Liczba wylężonych piskląt towarowych gęsi u największych producentów w UE w latach 2021–2025 (tys. szt.)

Kraj	2021	2022	2023	2024	2025*
Polska	6 198,83	6 793,00	7 167,89	6 481,33	2.820,98
Węgry	4 130,40	3 075,17	3 298,30	2 762,07	1 045,36
Francja	539,40	244,52	439,78	<i>brak danych</i>	168,13
Niemcy	785,51	843,68	935,39	949,94	120,07
Czechy	182,10	132,84	150,96	164,27	45,24

* brak danych dla Niemiec za I-III/2021, IX-XII.2021, III.2022, V.2022, III.2023, III.2024 oraz IX.2024, brak pełnych danych dla Austrii i Belgii, brak danych dla Francji za rok 2024 i I-II 2025, brak danych dla Niemiec i Czech (III/2025), Chorwacji (III i V/2025), Austrii (IV/2025)

* dane za okres od miesiąca stycznia do kwietnia 2025 r. włącznie

źródło: Eurostat

Tabela 8. Najwięksi eksporterzy i importerzy piskląt towarowych gęsi w UE w okresie od miesiąca stycznia do kwietnia 2025 r. (tys. szt.)*

Eksport		Import	
Polska	202,54	Węgry	256,99
Francja	36,57	Francja	0,07
Hiszpania	15,60		
Czechy	4,93		

* brak danych dla eksportu dla Belgii, Niemiec za 2025 rok oraz dla importu dla Niemiec (I-IV/2025) i dla Słowacji (IV/2025)

źródło: Eurostat

Tabela 9. Liczba ocenionych stad rodzicielskich kaczek typu pekin oraz dynamika oceny w 2024/2023

Okres oceny	Liczba ocen	Dynamika oceny 2024/2023 (%)
WYCHÓW	47	82,46
PRODUKCJA	60	176,47

źródło: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie (KRD-IG)

Tabela 10. Liczba piskląt hodowlanych kaczek (szt. samic) przyjętych do wychowu w latach 2021–2025

Miesiące / Lata	2021	2022	2023	2024	2025*
Styczeń	13 084	17 096	9 987	10 365	48 404
Luty	23 701	11 290	32 001	47 913	31 828
Marzec	13 247	37 878	42 301	33 427	27 140
I kwartał	50 032	66 264	84 289	91 705	107 372
Kwiecień	24 960	21 270	48 100	29 182	14 070
Maj	43 613	0	6 143	18 520	
Czerwiec	22 864	21 315	32 111	14 910	
II kwartał	91 437	42 585	86 354	62 612	
I półrocze	141 469	108 849	170 643	154 317	
Lipiec	4 160	6 920	20 551	20 030	
Sierpień	312	36 438	16 932	7 932	
Wrzesień	0	2 000	3 780	3 600	
III kwartał	4 472	45 358	41 263	31 562	
Październik	0	7 200	7 548	0	
Listopad	6 654	0	4 680	9 526	
Grudzień	4 284	16 225	0	22 443	
IV kwartał	10 938	23 425	12 228	31 969	
II półrocze	15 410	68 783	53 491	63 531	
Rok	156 879	177 632	224 134	217 848	

* dane za okres do miesiąca kwietnia 2025 r. włącznie

źródło: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie (KRD-IG)

Tabela 11. Wylęgi piskląt towarowych kaczek w Polsce w latach 2021–2025 (tys. szt.)

Miesiąc/Rok	Liczba piskląt kaczyc					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Styczeń	2 098,70	2 184,00	2 490,40	2 928,41	4 665,63	6 658,57
Luty	1 694,40	2 083,10	2 537,00	1 633,62	3 052,57	2 558,50
Marzec	1 449,70	2 131,80	2 951,45	2 084,20	2 535,90	2 117,83
Kwiecień	1 126,80	1 462,40	2 369,50	2 173,35	2 307,69	1 750,79
Maj	726,80	1 024,50	2 156,60	2 242,37	1 694,17	
Czerwiec	608,60	925,10	2 080,60	2 482,14	1 382,98	
Lipiec	896,70	956,60	1 686,60	2 237,07	1 628,64	
Sierpień	1 204,20	1 008,90	2 062,40	2 787,21	1 658,90	
Wrzesień	1 816,40	1 164,50	2 694,10	2 242,05	2 037,78	
Październik	2 379,10	1 210,80	2 821,60	3 261,03	3 235,29	
Listopad	2 086,20	1 515,60	3 535,70	3 370,50	2 231,08	
Grudzień	2 392,30	2 319,60	3 448,80	4 325,62	2 609,87	
Razem	18 479,90	17 986,90	30 834,75	31 767,55	29 040,48	13 085,69

** dane za okres do miesiąca kwietnia 2025 r. włącznie

źródło: Eurostat

Tabela 12. Polska – import i eksport piskląt towarowych kaczek w latach 2021–2025 (tys. szt.)

Lata	Import	Eksport	Saldo handlu zagranicznego
2020	10 325,58	178,20	-10 147,38
2021	5 300,61	72,05	-5 228,56
2022	4 028,97	575,07	-3 453,90
2023	5 915,87	198,38	-5 717,49
2024	7 452,64	163,98	-7 288,66
2025*	3 519,53	0,00	-3 519,53

* dane za okres od miesiąca stycznia do kwietnia 2025 r. włącznie

źródło: Eurostat

Tabela 13. Wielkość wylęgów piskląt towarowych kaczek u największych producentów w UE w latach 2021–2025 (tys. szt.)^{*}

Kraj	2021	2022	2023	2024	2025 ^{**}
Francja	74 313,27	47 422,60	60 590,83	69 160,95	20 468,11
Polska	17 987,05	30 834,82	31 767,57	29 040,50	13 085,69
Węgry	38 598,87	30 851,35	33 963,10	32 684,89	6 743,58
Czechy	4 595,62	6 896,35	10 835,05	8 611,24	3 164,71
Bułgaria	6 380,80	6 948,63	8 069,67	7 490,35	2 280,40
Niderlandy	6 984,00	6 171,00	6 183,00	4 883,00	1 752,00
Irlandia	3 763,00	2 525,00	4 087,00	4 400,00	1 508,00

^{*} brak danych za rok 2025 za okres I-IV dla Belgii, Niemiec, Austrii, Portugalii, Czech (I-II), Chorwacji (I-III) oraz Słowacji (III-IV)

^{**} dane za okres od stycznia do kwietnia 2025 r. włącznie

źródło: Eurostat

Tabela 14. Najwięksi eksporterzy i importerzy piskląt towarowych kaczek w UE w okresie od stycznia do kwietnia 2025 r. (tys. szt.)^{*}

Eksport		Import	
Czechy	3 818,37	Polska	3 519,53
Francja	2 002,17	Irlandia	573,00
Irlandia	600,00	Węgry	531,07
Węgry	79,63	Hiszpania	259,31
Austria	5,87	Rumunia	115,00
Portugalia	1,45	Portugalia	26,66
		Chorwacja	10,60
		Słowacja	10,17
		Francja	6,12

^{*} brak danych dotyczących eksportu dla Belgii i Niemiec oraz importu dla Niemiec i Słowacji (I, III/2025)

źródło: Eurostat

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*

STADA RODZICIELSKIE WYCHÓW




Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średnia liczba piskląt przyjętych do wychowu (szt.)		do 7. dnia życia		Padnięcia do końca wychowu (%)		Brakowania zdrowotne do końca wychowu (%)	Inne ubytki (%)		Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀		♂♂	♀♀	
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	44	354	1 450	0,8	0,6	3,4	3,0	0,3	0,2	0,2	36,5
TAPPHORN	2	140	564	0,3	0,1	2,8	5,8	0,7	0,0	0,0	43,5
OGÓŁEM/ŚREDNIA	46	345	1 411	0,8	0,6	3,3	3,1	0,3	0,2	0,2	36,9

* stada, które zakończyły wychów w 2024 r.

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – okres wychowu



Zakres procentowego udziału samic

0,31 - 0,68

2,79 - 3,22

5,54 - 6,26

13,12

24,90

43,18

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2024 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH GĘSI
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

WYCHÓW



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	14	3 810	16 165
wielkopolskie	14	6 907	28 033
lubelskie	7	2 099	8 518
łódzkie	4	899	3 594
dolnośląskie	2	1 014	4 063
pomorskie	2	520	2 090
podlaskie	1	450	1 811
śląskie	1	110	440
warmińsko-mazurskie	1	51	200
OGÓŁEM	46	15 860	64 914

* stada, które zakończyły wychów w 2024 r.

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*



STADA RODZICIELSKIE
PIERWSZY SEZON PRODUKCJI

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niośki PL**		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyłag piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji niesnej	Zużycie paszy treściwej z jaj na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	zniesionych	wylęgowych (szt.)					
OGÓŁEM ŚREDNIA	54	269	1 107	4,0	3,8	1,3	1,2	0,3	0,4	50,8	49,5	31,3	77,5	62,6	163	60,3
BIAŁA KOLUDZKA W-33 x W-11	52	273	1 124	4,0	3,7	1,3	1,2	0,3	0,4	51,0	49,7	31,3	77,3	62,4	163	60,5
TAPPHORN	2	171	644	4,2	4,9	1,6	1,2	0,0	0,0	44,6	43,8	30,3	80,8	67,9	149	53,6

do 21. tygodnia (do 147. dnia)

OGÓŁEM ŚREDNIA	10	196	792	4,4	4,4	1,7	1,0	0,0	0,0	43,4	40,9	32,1	78,9	68,6	135	56,1
BIAŁA KOLUDZKA W-33 x W-11	9	211	853	4,3	4,5	1,5	0,9	0,0	0,0	44,0	41,2	32,2	79,4	69,4	137	56,6
TAPPHORN	1	62	248	4,8	4,0	3,2	2,4	0,0	0,0	38,4	38,2	32,0	74,6	62,0	120	53,6

od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 175. dnia)

BIAŁA KOLUDZKA W-33 x W-11	33	231	967	4,0	3,5	0,3	0,7	0,5	0,5	52,3	51,3	32,0	78,3	61,7	163	62,3
----------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	------

powyżej 25. tygodnia (powyżej 175. dnia)


OGÓŁEM ŚREDNIA	11	449	1 810	3,8	4,0	4,0	2,8	0,0	0,6	52,8	51,9	28,5	72,8	59,3	186	57,6
BIAŁA KOLUDZKA W-33 x W-11	10	465	1 887	3,9	3,8	4,4	3,0	0,0	0,7	53,0	52,2	28,5	71,0	57,5	187	57,6
TAPPHORN	1	280	1 040	3,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	49,3	28,5	87,0	73,7	178	brak danych

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 1. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

1,74 - 3,02

4,13 - 4,85

5,31 - 6,17

27,15

32,95

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych

Wykres 1




Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*

STADA RODZICIELSKIE

PIERWSZY SEZON PRODUKCJI**



Liczba jaj zniesionych i wylęganych od nioski początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** dotyczy stad rodzicielskich gęsi W-33 x W-11

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2024 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

PIERWSZY SEZON PRODUKCJI



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	16	3 872	16 223
wielkopolskie	15	4 831	19 693
lubelskie	3	628	2 467
łódzkie	3	787	3 171
warmińsko-mazurskie	3	857	3 690
małopolskie	2	427	1 704
podlaskie	2	305	1 535
pomorskie	2	346	1 440
śląskie	2	434	1 733
zachodniopomorskie	2	447	1 803
dolnośląskie	1	280	1 040
lubuskie	1	715	2 900
mazowieckie	1	290	1 160
podkarpackie	1	300	1 200
OGÓŁEM	54	14 519	59 759

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.



Tabela 19

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2024 r.*



STADA RODZICIELSKIE
DRUGI SEZON PRODUKCJI

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niosek PL**		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wylęg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnia (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	zniesionych	wylęgowych (szt.)					
OGÓŁEM/ŚREDNIA	49	364	1 469	5,0	4,8	0,5	0,6	0,5	0,6	51,6	50,3	31,5	80,4	63,7	162	61,1
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	47	378	1 527	4,7	4,2	0,5	0,7	0,5	0,7	53,1	51,8	32,4	80,7	64,0	163	61,8
GĘŚ NADWARCIAŃSKA	2	29	106	10,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,2	11,7	73,6	58,0	142	46,3

do 21. tygodnia (do 147. dnia)

OGÓŁEM/ŚREDNIA	9	113	456	6,3	8,8	0,2	0,2	0,0	0,0	43,5	42,6	32,2	82,4	65,0	124	53,5
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	7	137	556	5,0	5,1	0,3	0,2	0,0	0,0	52,5	51,4	39,0	85,4	67,3	119	55,9
GĘŚ NADWARCIAŃSKA	2	29	106	10,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,2	11,7	73,6	58,0	142	46,3

od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 175. dnia)

BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	26	262	1 061	3,7	3,4	0,6	0,5	0,0	0,3	53,0	51,6	32,4	79,2	63,2	163	61,4
----------------------------	----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	------

powyżej 25. tygodnia (powyżej 175. dnia)


BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	14	714	2 878	6,5	5,2	0,3	1,2	1,6	1,5	53,6	52,2	29,4	81,6	63,9	183	65,8
----------------------------	----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	------

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 2. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

0,45 - 0,56

1,50 - 2,14

3,10 - 3,19

4,93 - 6,20

21,40 - 23,69

26,95

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych


Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*

STADA RODZICIELSKIE

DRUGI SEZON PRODUKCJI**



Liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** dotyczy stad rodzicielskich gęsi W-33 x W-11

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2024 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

DRUGI SEZON PRODUKCJI



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	16	4 768	19 398
wielkopolskie	11	4 277	17 056
pomorskie	6	875	3 546
podlaskie	4	1 020	4 466
lubelskie	2	535	2 235
małopolskie	2	266	1 079
mazowieckie	2	580	2 300
opolskie	2	375	1 541
dolnośląskie	1	3 895	15 406
lubuskie	1	1 050	4 240
łódzkie	1	100	400
warmińsko-mazurskie	1	79	321
OGÓŁEM	49	17 820	71 988

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.



Tabela 21

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*



STADA RODZICIELSKIE TRZECI SEZON PRODUKCJI

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niośki PL**		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	zniesionych	wylęgowych (szt.)					
OGÓŁEM/ŚREDNIA	43	353	1 426	4,8	5,5	1,3	1,0	1,4	1,4	49,2	48,1	30,0	79,7	61,8	164	61,7
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	43	353	1 426	4,8	5,5	1,3	1,0	1,4	1,4	49,2	48,1	30,0	79,7	61,8	164	61,7

do 21. tygodnia (do 147. dnia)

BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	6	367	1 448	6,6	7,7	0,5	0,4	0,5	0,4	40,1	39,1	29,7	77,4	60,3	134	48,3
----------------------------	---	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	------

od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 175. dnia)

BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	27	244	993	4,3	5,0	1,0	1,3	0,5	0,6	52,1	50,9	31,8	80,9	62,4	163	62,7
----------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	------

powyżej 25. tygodnia (powyżej 175. dnia)


BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	10	642	2 581	4,9	5,8	2,8	0,7	4,4	4,2	46,8	46,0	25,3	77,1	60,9	186	65,6
----------------------------	----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	------

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 3. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

0,71 - 1,79

3,49 - 3,61

6,56 - 8,33

12,92

19,74

31,09

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych



Wykres 3


Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*



STADA RODZICIELSKIE

TRZECI SEZON PRODUKCJI**

**Liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji**



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** dotyczy stad gęsi W-33 x W-11

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2024 r.

LICZBA STAD RODZICIELSKICH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

TRZECI SEZON PRODUKCJI



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	13	4 599	19 061
lubelskie	5	1 248	5 105
wielkopolskie	5	2 046	7 922
łódzkie	4	978	4 020
pomorskie	4	538	2 171
małopolskie	3	528	2 212
dolnośląskie	2	3 030	12 103
mazowieckie	2	332	1 095
podlaskie	2	510	2 140
lubuskie	1	1 080	4 350
podkarpackie	1	210	690
śląskie	1	99	435
OGÓŁEM	43	15 198	61 304

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.



Tabela 23

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*




STADA RODZICIELSKIE
CZWARTY SEZON PRODUKCJI

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od noski PL**		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji niesnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	zniesionych	wylęgowych do wylęgu (szt.)					
OGÓŁEM/ŚREDNIA	36	225	914	7,3	6,4	1,6	1,2	0,0	0,0	46,4	45,3	29,8	78,5	60,4	156	58,1
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	36	225	914	7,3	6,4	1,6	1,2	0,0	0,0	46,4	45,3	29,8	78,5	60,4	156	58,1
do 21. tygodnia (do 147. dnia)																
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	10	165	653	7,7	9,8	3,2	3,1	0,0	0,0	38,1	36,9	28,5	79,9	62,2	135	56,2
od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 175. dnia)																
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	26	248	1 015	7,1	5,1	1,0	0,6	0,0	0,0	49,7	48,5	30,3	77,9	59,8	164	58,9

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.
** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 4. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

- 1,18
- 3,16 - 4,92
- 9,34 - 10,04
- 32,18 - 34,93
- średni procent padnięć
- średni procent brakowań zdrowotnych


Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*

STADA RODZICIELSKIE

CZWARTY SEZON PRODUKCJI**



Liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** dotyczy stad gęsi W-33 x W-11

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2024 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

CZWARTY SEZON PRODUKCJI



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	13	2 827	11 498
wielkopolskie	8	2 583	10 591
łódzkie	5	794	3 306
lubelskie	4	418	1 618
pomorskie	3	769	3 073
dolnośląskie	1	350	1 400
podlaskie	1	260	1 040
warmińsko-mazurskie	1	98	390
OGÓŁEM	36	8 099	32 916

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.



Tabela 25

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*



STADA RODZICIELSKIE
PIĄTY SEZON PRODUKCJI


Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niosek PL**		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią
		♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	zniesionych	wylęgowych (szt.)					
OGÓŁEM	8	188	697	18,1	14,6	14,5	10,9	0,0	0,0	39,5	35,9	25,9	77,4	62,7	154	64,3
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	8	188	697	18,1	14,6	14,5	10,9	0,0	0,0	39,5	35,9	25,9	77,4	62,7	154	64,3
do 21. tygodnia (do 147. dnia)																
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	3	123	295	28,3	27,8	38,1	28,3	0,0	0,0	40,2	32,1	28,9	88,5	74,5	138	66,6
od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 175. dnia)																
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	5	226	937	12,0	6,7	0,4	0,4	0,0	0,0	39,0	38,1	24,1	70,7	55,6	163	62,5

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 5. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

3,23

6,28

9,69 - 9,87

70,93

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych

Wykres 5




Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*

STADA RODZICIELSKIE

PIĄTY SEZON PRODUKCJI**



Liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** dotyczy stad gęsi W-33 x W-11

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2024 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

PIĄTY SEZON PRODUKCJI



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	4	1 079	3 953
łódzkie	1	140	540
pomorskie	1	83	350
warmińsko-mazurskie	1	65	180
wielkopolskie	1	133	550
OGÓŁEM	8	1 500	5 573

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.



Tabela 27

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*



STADA RODZICIELSKIE

Sezon produkcji/ rok wychowu	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od noski PL** zniesionych wylęgowych do wylęgu		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wylęg piskląt z jaj nałożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy tręściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	(szt.)						

PRODUKCJA OD PIERWSZEGO DO PIĄTEGO SEZONU

ZESTAWIENIE WEDŁUG SEZONU PRODUKCJI

I / 2023 r.	54	269	1 107	4,0	3,8	1,3	1,2	0,3	0,4	50,8	49,5	49,4	31,3	77,5	62,6	163	60,3
II / 2022 r.	49	364	1 469	5,0	4,8	0,5	0,6	0,5	0,6	51,6	50,3	50,0	31,5	80,4	63,7	162	61,1
III / 2021 r.	43	353	1 426	4,8	5,5	1,3	1,0	1,4	1,4	49,2	48,1	48,1	30,0	79,7	61,8	164	61,7
IV / 2020 r.	36	225	914	7,3	6,4	1,6	1,2	0,0	0,0	46,4	45,3	45,2	29,8	78,5	60,4	156	58,1
V / 2019 r.	8	188	697	18,1	14,6	14,5	10,9	0,0	0,0	39,5	35,9	35,6	25,9	77,4	62,7	154	64,3
OGÓŁEM/ŚREDNIA	190	301	1 219	5,6	5,4	1,7	1,4	0,5	0,6	49,3	48,0	47,9	30,6	78,9	62,3	161	60,5

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** PL — początkowa liczba niosek



Tabela 28



Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*

STADA RODZICIELSKIE

PRODUKCJA OD PIERWSZEGO DO PIĄTEGO SEZONU

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niosek PL**		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wylęg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji niesnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	zniesionych	wylęgowych					

ZESTAWIENIE WEDŁUG TYGODNI (DNI) PRODUKCJI

OGÓŁEM/ŚREDNIA	190	301	1 219	5,6	5,4	1,7	1,4	0,5	0,6	49,3	48,0	47,9	30,6	78,9	62,3	161	60,5
BIŁAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	186	305	1 237	5,6	5,2	1,7	1,5	0,5	0,6	49,7	48,4	48,2	30,8	78,9	62,3	162	60,8
GEŚ NADWARCIAŃSKA	2	29	106	10,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,2	16,2	11,7	73,6	58,0	142	46,3
TAPPHORN	2	171	644	4,2	4,9	1,6	1,2	0,0	0,0	44,6	43,8	43,8	30,3	80,8	67,9	149	53,6

do 121. tygodnia (do 147. dnia)

OGÓŁEM/ŚREDNIA	38	189	740	8,0	9,2	4,6	3,5	0,1	0,1	41,2	39,2	39,0	30,5	80,6	65,4	132	55,7
BIŁAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	35	202	790	8,0	8,8	4,9	3,8	0,1	0,1	42,7	40,6	40,4	31,6	81,2	65,9	132	56,5
GEŚ NADWARCIAŃSKA	2	29	106	10,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,2	16,2	11,7	73,6	58,0	142	46,3
TAPPHORN	1	62	248	4,8	4,0	3,2	2,4	0,0	0,0	38,4	38,2	38,2	32,0	74,6	62,0	120	53,6

od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 147. dnia)

BIŁAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	117	244	1 003	5,0	4,3	0,7	0,7	0,3	0,4	51,3	50,1	50,0	31,3	78,7	61,5	163	61,4
-----------------------------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	------

powyżej 25. tygodnia (powyżej 175. dnia)


OGÓŁEM/ŚREDNIA	35	610	2 458	5,2	5,0	2,2	1,5	1,9	2,0	51,4	50,4	50,1	27,9	77,6	61,6	185	63,1
BIŁAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	34	620	2 499	5,3	4,9	2,3	1,6	2,0	2,0	51,4	50,4	50,1	27,9	77,3	61,2	185	63,1
TAPPHORN	1	280	1 040	3,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	49,3	49,3	28,5	87,0	73,7	178	brak danych

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 1. – 5. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

0,67 - 0,94

1,97 - 3,97

4,57 - 4,96

12,93

24,10

30,29

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych


Ocena wartości użytkowej gęsi w 2024 r.*

STADA RODZICIELSKIE

PRODUKCJA OD PIERWSZEGO DO PIĄTEGO SEZONU




Liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Średni procent nieśności, średnia liczba jaj zniesionych, średnia liczba jaj nałożonych do wylęgu oraz średnia liczba piskląt od nioski stanu początkowego (1. – 5. sezon produkcji)



Zakres średniego procentu nieśności

21,95

26,15 - 28,02

29,26 - 30,90


31,41 - 33,97

34,07 - 35,80

średnia liczba jaj zniesionych od nioski stanu początkowego


średnia liczba jaj nałożonych do wylęgu o d nioski stanu początkowego

średnia liczba piskląt od nioski stanu początkowego




STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Udział samic w poszczególnych sezonach produkcji



Zakres procentowego udziału samic



Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2024 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

PRODUKCJA OD PIERWSZEGO DO PIĄTEGO SEZONU



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	62	17 145	70 133
wielkopolskie	40	13 870	55 812
pomorskie	16	2 611	10 580
lubelskie	14	2 829	11 425
łódzkie	14	2 799	11 437
podlaskie	9	2 095	9 181
małopolskie	7	1 221	4 995
warmińsko-mazurskie	6	1 099	4 581
dolnośląskie	5	7 555	29 949
mazowieckie	5	1 202	4 555
lubuskie	3	2 845	11 490
śląskie	3	533	2 168
opolskie	2	375	1 541
podkarpackie	2	510	1 890
zachodniopomorskie	2	447	1 803
OGÓŁEM	190	57 136	231 540

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

Ocena wartości użytkowej drobiu w 2024 r.*



STADA TOWAROWE GĘSI

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średnia liczba piskląt przyjętych do odchovu	Padnięcia (%)			Średnia masa ciała (kg)	Zużycie paszy treściwej na kg przyrostu masy ciała (kg)	Średnia liczba dni odchovu	Średni przyrost dzienny (g/dzień)	Europejski Wskaźnik Wydajności **
			do 3. dnia	do 7. dnia	do końca odchovu					
			życia							

WSZYSTKIE STADA (samce i samice)

W-31	139	5 885	0,0	0,1	4,4	6,47	5,29	119	54,4	98,2
------	-----	-------	-----	-----	-----	------	------	-----	------	------

ZESTAWIENIE WEDŁUG DŁUGOŚCI DNI ODCHOWU

do 120. dnia

W-31	81	6 081	0,0	0,1	4,6	6,15	5,35	113	54,4	96,9
------	----	-------	-----	-----	-----	------	------	-----	------	------

powyżej 120. dnia

W-31	58	5 612	0,0	0,0	4,2	6,85	5,16	127	54,7	100,1
------	----	-------	-----	-----	-----	------	------	-----	------	-------

* dane dotyczą stad, których odchów na zasadach produkcji gęsi owslanej został zakończony w 2024 r.

** Europejski Wskaźnik Wydajności = $\frac{\text{przeżywalność (\%)} \times \text{masa ciała (kg)}}{\text{liczba dni odchovu} \times \text{zużycie paszy na 1 kg masy ciała (kg)}}$ x 100



Tabela 31

Ocena wartości użytkowej kaczek w 2024 r.*
STADA RODZICIELSKIE
WYCHÓW KACZEK TYPU PEKIN




Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średnia liczba piskląt przyjętych do wychowu (szt.)		do 7. dnia życia		Padnięcia do końca wychowu (%)		Brakowania zdrowotne do końca wychowu (%)		Inne ubytki (%)		Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	
SM3 HEAVY	20	617	3 104	1,3	0,8	5,3	4,0	0,9	0,6	0,0	0,0	23,9
ST5 HEAVY	14	857	4 049	1,3	1,9	3,6	3,4	0,6	0,5	2,4	1,9	24,8
SM3 MEDIUM	5	1 407	7 035	0,7	0,7	3,5	2,3	0,5	0,3	0,0	0,0	27,2
STAR 53 H.Y. (High Yield)	4	1 218	6 090	0,5	0,3	5,4	2,1	2,7	1,0	0,0	0,0	24,0
P-55 x P-44	3	67	260	1,6	0,5	3,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4
WHITE PEKIN	1	1 020	5 100	5,0	1,0	11,8	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	brak danych
OGÓŁEM/ŚREDNIA	47	797	3 918	1,2	1,1	4,6	3,3	0,8	0,5	0,7	0,6	25,9

* dotyczy stad, których wychów został zakończony w 2024 r.

STADA RODZICIELSKIE KACZEK TYPU PEKIN

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – okres wychowu



Zakres procentowego udziału samic

0,17 - 0,27

2,85 - 3,79

7,86 - 8,70

11,90

20,52

43,95

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych



Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2024 r.*

**LICZBA STAD RODZICIELSKICH
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH
WYCHÓW**

Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
wielkopolskie	16	16 407	78 695
lubelskie	7	2 816	14 076
łódzkie	7	3 116	15 576
dolnośląskie	6	7 350	36 750
warmińsko-mazurskie	4	4 261	21 304
kujawsko-pomorskie	2	125	480
śląskie	2	1 286	6 786
mazowieckie	1	1 020	5 100
pomorskie	1	75	300
zachodniopomorskie	1	1 020	5 100
OGÓŁEM	47	37 476	184 167

* dotyczy stad, których wychów został zakończony w 2024 r.

Ocena wartości użytkowej kaczek w 2024 r.*

STADA RODZICIELSKIE
PRODUKCJA KACZEK TYPU PEKIN**

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niosek PL*** wylęgowych nalożonych do wylęgu (szt.)		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀							
SM3 HEAVY	28	620	3 106	8,4	8,8	3,8	2,3	2,7	2,7	169,5	166,2	63,9	92,5	75,6	272	57,7
ST5 HEAVY	15	688	3 477	8,7	9,3	2,1	1,7	0,0	0,0	170,7	168,2	72,3	91,9	73,5	244	56,6
STAR 53 H.Y. (High Yield)	9	898	4 467	6,3	7,0	2,8	2,5	1,2	1,1	218,3	215,3	68,3	90,0	69,6	336	78,7
SM3 MEDIUM	5	1 050	5 621	11,3	12,0	3,7	3,8	3,9	2,3	182,9	176,9	61,4	93,5	70,9	319	69,7
P-55 x P-44	2	60	248	5,0	2,5	2,1	0,9	0,0	0,0	104,5	104,5	55,7	88,3	68,5	198	46,9
ST5 SUPER HEAVY	1	302	1 515	23,2	9,9	6,6	5,3	0,0	0,0	212,0	212,0	76,4	90,8	75,0	294	brak danych
OGÓŁEM/ŚREDNIA	60	690	3 490	8,6	8,8	3,2	2,3	1,8	1,6	176,8	173,7	66,4	91,9	73,5	276	61,3


* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** dotyczy stad w pierwszym i drugim sezonie produkcji

*** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE KACZEK TYPU PEKIN

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – okres produkcji



Zakres procentowego udziału samic

0,14 - 1,57

4,78

7,09 - 9,61

23,96


50,06

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych

STADA RODZICIELSKIE KACZEK TYPU PEKIN

Sredni procent nieśności oraz średnia liczba jaj zniesionych, średnia liczba jaj nałożonych do wylęgu i średnia liczba piskląt od nioski stanu początkowego



Zakres średniego procentu nieśności

22,6

48,2

61,7 - 63,7

68,5 - 70,1

76,1

79,2

średnia liczba jaj zniesionych od nioski stanu początkowego

średnia liczba jaj nałożonych od nioski stanu początkowego

średnia liczba piskląt od nioski stanu początkowego






Tabela 34

Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2024 r.*
STADA RODZICIELSKIE
PRODUKCJA KACZEK TYPU PEKIN
PIERWSZY SEZON



Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niosek PL** wylęgowych (szt.)		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wylęg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀							
SM3 HEAVY	24	640	3 254	8,0	8,4	4,2	2,5	3,2	3,1	173,2	169,3	63,7	92,0	75,4	278	58,8
ST5 HEAVY	14	723	3 655	9,3	10,0	2,2	1,8	0,0	0,0	177,0	174,4	73,8	92,1	73,6	250	56,6
STAR 53 H.Y. (High Yield)	9	898	4 467	6,3	7,0	2,8	2,5	1,2	1,1	218,3	215,3	68,3	90,0	69,6	336	78,7
SM3 MEDIUM	4	1 220	6 589	12,5	13,6	4,6	4,7	4,9	2,9	193,6	186,0	66,2	93,5	70,4	310	69,7
P-55 x P-44	2	60	248	5,0	2,5	2,1	0,9	0,0	0,0	104,5	104,5	55,7	88,3	68,5	198	46,9
ST5 SUPER HEAVY	1	302	1 515	23,2	9,9	6,6	5,3	0,0	0,0	212,0	212,0	76,4	90,8	75,0	294	brak danych
OGÓŁNIEŚREDNIA	54	720	3 663	8,5	8,8	3,5	2,5	2,0	1,8	181,4	177,9	67,2	91,7	73,3	280	62,1


* dotyczy stad, które zakorzystały produkcję w 2024 r.

** PL – początkowa liczba niosek

Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2024 r.*



**STADA RODZICIELSKIE
KACZKI TYPU PEKIN
PIERWSZY SEZON**



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.



Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2024 r.*

STADA RODZICIELSKIE
PRODUKCJA KACZEK TYPU PEKIN
DRUGI SEZON




Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niosek PL** wylęgowych do wylęgu (szt.)		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nałożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀							
SM3 HEAVY	4	499	2 216	11,4	11,6	1,3	0,9	0,0	0,0	147,8	147,7	65,0	96,3	76,8	235	53,6
SM3 MEDIUM	1	370	1 750	6,8	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	140,4	42,0	brak danych	73,0	357	brak danych
ST5 HEAVY	1	194	986	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	81,7	51,0	88,6	72,4	167	brak danych
OGÓŁEM/ŚREDNIA	6	427	1 934	8,8	8,7	0,9	0,6	0,0	0,0	135,7	135,5	57,6	94,4	75,5	244	53,6

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.

** PL – początkowa liczba niosek

Ocena wartości użytkowej kaczek w 2024 r.*


**STADA RODZICIELSKIE
KACZKI TYPU PEKIN
DRUGI SEZON**


* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2024 r.



Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2024 r.

**LICZBA STAD RODZICIELSKICH
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH
PRODUKCJA**

Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
wielkopolskie	24	21 070	104 836
łódzkie	15	9 436	50 176
lubelskie	6	1 989	10 006
śląskie	5	2 934	14 856
warmińsko-mazurskie	4	3 987	20 121
kujawsko-pomorskie	3	542	2 686
mazowieckie	1	780	3 280
pomorskie	1	71	295
świętokrzyskie	1	611	3 171
OGÓŁEM	60	41 420	209 427

* stada, które zakończyły produkcję w 2024 r.

Ocena wartości użytkowej **kaczek** w 2024 r.*



STADA BROJLERÓW KACZYCH

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średnia liczba piskląt przyjętych do odchowu	Padnięcia (%)		Średnia masa ciała (kg)	Zużycie paszy treściwej na kg przyrostu masy ciała (kg)	Średnia liczba dni odchowu	Średni przyrost dzienny (g/dzień)	Europejski Wskaźnik Wydajności **
			do 3. dnia	do 7. dnia życia					

KACZKI TYPU PEKIN

odchow łączny (samce i samice)

STAR 53 H.Y.	68	9 342	0,1	1,0	5,3	3,31	2,44	43	75	299,4
ST5 HEAVY	52	8 927	0,1	0,7	4,4	3,45	2,46	46	73	291,4
SM3 HEAVY	45	8 440	0,1	0,8	4,5	3,54	2,53	48	73	282,6
ST5 SUPER HEAVY	13	12 562	0,1	1,5	6,5	3,52	2,49	45	76	293,2
SM3 MEDIUM	9	9 650	0,1	1,3	5,8	3,43	2,51	44	75	289,0
P-55 x P-44	7	8 976	0,0	0,4	3,7	3,53	2,32	44	79	336,5
OGÓŁEM/ŚREDNIA	194	9 239	0,1	0,9	4,9	3,43	2,47	45	74	293,8

* dane dotyczą stad, których odchow został zakończony w 2024 r.

** Europejski Wskaźnik Wydajności = $\frac{\text{przeżywalność (\%)} \times \text{masa ciała (kg)}}{\text{liczba dni odchowu} \times \text{zużycie paszy na 1 kg masy ciała (kg)}} \times 100$

NOTATKI